This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

1913 e.
15

600036403M

4.70.E.28.

E. BIBL. RADCL.

1913 e 15

ENUMERATIO

PLANTARUM IN ORIENTE

LECTARUM.

ENUMERATIO

PLANTARUM QUAS IN INSULIS ARCHIPELAGI AUT LITTORIBUS PONTI-EUXINI,

ANNIS 1819 ET 1820,

COLLEGIT ATQUE DETEXIT

J. DUMONT D'URVILLE.

PARISIIS,

EX TYPIS D'HAUTEL,

VENITQUE APUD CAUSETTE, BIBLIOPOLAM,

(Quai des Grands-Augustins, n°. 35 (*bis*).)

1822.

Extrait du 1^er^. volume des Mémoires de la Société Linnéenne de Paris.

PRÆFATIO.

Arduis maris laboribus jamdudùm deditus, otiosas portûs horas Botanices grato studio à duobus annis dulcè impendebam. Jàm peragraveram montes, valles, campos, littora Telonis vicina : mille et quingentas species phanerogamas collegeram floramque Telonensem suscipere mihi mens erat. Sed 3 aprili 1819 navim regis *la Chevrette* conscendere jussus, imperanteque claro *H. Gautier* vela fecimus in Archipelagum. Hic ab aprilis fine usque medium octobrem invisimus et emensi sumus multas celebres insulas, quædam inclyta littora, nempè : Melitam, Melum, Cimolum, Theram, Astypalæam, Coum, Lerum, Samum, sinum Smyrnæum, Psyram, Scyrum, Lesbum, Tenedum, Thasum, Singiticum sinum, littus Thessalonicum, Scopelum, sinum Pelasgum, Myconum, littus Atticum, ipsas Athenas, iterùm Melum. Medio novembri sequente propè lazaret Telonensem anchoram demisimus.

3 Aprili 1820 rursùs eâdem navi vecti, in Orientem tetendimus, oras Ponti-Euxini perlustravimus et appulimus ad diversos locos, scilicet : ad insulam Melum, Byzantium, Theodosiam, Panticapæam, Soukoum in Colchide, Trapezum, iterùm Theodosiam, Sevastopo-

lem, Odessam, Sisopolim et Incadam in Bulgariâ, iterùm Byzantium, Naupliam in Argolide, denique rursùs ad Melum, undè in Galliam medio octobri regressi sumus.

Muneribus nauticis atque observationibus astronomicis sæpiùs impeditus sum. Attamen, favente duce juvantibusque comitibus, dulcia studia non omisi amœnamque scientiam colere interdùm licuit. Ex utroque itinere locupletem plantarum segetem reportavi, nongentas circitèr species; plures equidem descriptas, multas adhùc rariores, nonnullas denique omninò novas.

Pro scientiâ nonnullius fore momenti mihi videbatur, si plantarum cognitarum novas adderem habitationes, si novarum stirpium darem phrasim descriptivam; cœptumque suadebant amici scientiæ. Sed muneribus alienis incumbere coactus jureque viribus diffisus hærebam semper. Tùm clariss. D. D. Desfontaines et De Jussieu, præstantes in scientiâ viri, sua immensa herbaria evolvenda permiserunt summâ cum benevolentiâ consiliaque suppeditaverunt.

Insuper attenta autopsia herbariorum Musæi et Tournefortii iconumque pictoris Aubriet ad species determinandas synonymiasque statuendas mihi non parùm juvit. His incitamentis motus, his auxiliis auctus illud opus aggredi ausus sum. Utinàm feliciùs excqui mihi datum fuisset.

Dabam Lutetiæ Parisiorum, D. 31 decembris 1821.

Auctores sæpiùs in hoc Opere citati.

Sp. pl. —*Linnæi.* Species plantarum. 1764.

Wild. Sp. — *Willdenow.* Species plantarum Linnæi. vol. 5. 1797-1810.

Sibth. —*Sibthorp* et *Smith.* Floræ græcæ prodromus. vol. 2. 1806-1816.

Marsch. Fl. taur. —*Marschall de Bieberstein.* Flora Taurico-caucasica. tom. 3. 1808-1819.

D. C. Fl. fr. —*Lamarck* et *De Candolle.* Flore française. vol. 5. 1805-1815.

D. C. Syst. nat. — *De Candolle.* Regni vegetabilis Systema naturale. vol. 2. 1818-1821.

Loisel. Fl. gal.—*Loiseleur Deslongchamps.* Flora gallica. vol. 2. 1806-1810.

Desf. Fl. atl. —*Desfontaines.* Flora atlantica. vol. 2. 1798 et 1799.

Desf. Cor.—Id. Choix de plantes du corollaire des instituts de Tournefort. 1808.

Herb. Tourn.—Phrasis ex ipsâ manu Tournefortii in ejus Herbario.

Gundelsheimer in Herb. Tourn. — Phrasis ex manu Gundelsheimer in Herbario Tournefortiano.

Icon. Aubriet.—Icones pictoris *Aubriet* in bibliothecâ Jussiæâ servatæ.

ENUMERATIO

Plantarum quas in insulis Archipelagi aut littoribus Ponti-Euxini, annis 1819 et 1820, collegit atque detexit J. DUMONT D'URVILLE.

I. MONANDRIA.

MONOGYNIA.

1. SALICORNIA *herbacea. Linn. Sp. pl. 5. Sibth. n. 1.* In salsis insulæ Meli. ☉

II. DIANDRIA.

MONOGYNIA.

2. PHYLLIREA *media. Sp. pl. 10. Sibth. n. 9* — In archipelagi insulis, imprimis in Lesbo. ♄.

3. LIGUSTRUM *vulgare. Sp. pl. 10. Sibth. n. 8.* — In nemoribus Colchidis, circà Soukoum. ♄.

4. OLEA *europæa. Sp. pl. 11. Sibth n. 11.* — Spontaneus frutex diffusus, spinosus, crescit in collibus

totius Græciæ. In insulâ Lesbo culturâ ad altitudinem 10-15 hexapodum assurgit. ♄.

5. CIRCÆA *Lutetiana. Sp. pl.* 12. *Sibth. n.* 13. — Circa Byzantium, in collibus umbrosis ad pagum *Therapia.* ♃.

6 VERONICA *chamædrys. Sp. pl.* 17. *Sibth. n.* 26 — propè Byzantium, in nemoribus. ♃.

7. V. *Austriaca. Sp. pl.* 17. *Sibth. n.* 28. *Marsch. Fl. Taur. n.* 33.

V. Austriaca, foliis tenuissimè laciniatis. *Tourn. Inst. Herb. Tourn.* — In Tauriæ pascuis, in Lazaret Odessæ, in insulâ Berezen. floret junio. ♃.

8. V. *spuria. Sp. pl.* 13. *Marsch. Fl. taur. n.* 13. *suppl. p.* 8. — In Lazaret Odessæ, in insulâ Berezen frequens, maio, junio. ♃ Quandoque variat spicis ad caulis apicem multis paniculatis.

9. V. *cymbalaria. Sibth. n.* 34. *D. C. Fl. fr. supp. p.* 389. V. *cymbalariæ-folia. Vahl. Enum.* 1 *p.* 81.

V. Chia, Cymbalariæ folio, verna flore albo umbilico virescente. *Tour. Cor.* 7. *Buxbaum. c.* 1 *t.* 39. *f.* 2.

V. Cymbalariæ folio verna. *Herb. Tourn.* — In arvis Asiæ minoris, propè Byzantium. ☉.

10. V. *Buxbaumii. Marsch. Fl. taur. n.* 35.

V. *agrestis. b. Sibth. n.* 31.

V. Flosculis oblongis pediculis insidentibus, chamædryos folio, major. *Buxb. c.* 1. 40. *f.* 2. In sepibus Colchidis hanc speciem collegi junio florentem. ☉.

11. V. *serpylli-folia, Sp. pl.* 15. *Sibth. n.* 30. — Ad sepes Asiæ minoris, propè Byzantium. ☉.

12. V. *verna. Sp. pl.* 19. — In pascuis Tauriæ, propè Kerch. ☉.

13. LYCOPUS *Europæus. Sp. pl.* 30. *Sibth. n.* 42. — In sylvis Bulgariæ, ad torrentes. ♃.

14. SALVIA *baccifera. Etling. Salvia. n.* 4.—Salvia baccifera. *Tourn. inst.* 180. *Herb. Tourn.* — In apricis Græciæ copiosè crescit dumetis densis rotundatis. Aprili floret. ♄.

15. S. *triloba. Linn. supp.* 88. *Sibth. n.* 49.

S. Cretica pomifera Clusii, flore albo. *Tourn. Cor.* 10. *Icon. Aubriet.* — Forsàn cum præcedente jungenda: differre tamen videtur ramis sparsis, virgatis; floribus majoribus et albidis, tandem calyce multò minus viscoso. Frequens in collibus aridis insularum Archipelagi. Maio floret. ♄.

16. S. *sylvestris. Sp. pl.* 34. *Sibth. n.* 53. S. *nemorosa. Marsch. Fl. taur. n.* 53 — In Tauriæ pascuis, circà Theodosiam, Sevastopolem et Odessam. Junio floret. ♃.

17. S. *campestris. Marsch. Fl. taur. n.* 54.

S. foliis cordatis oblongis duplicato crenatis subrepandis hirsutis, racemis virgatis, bracteis calyce brevioribus, pedicellis tomentosis.

S. pratensis, foliis serratis, flore minimo cœruleo. *Herb. Tourn.* — Circà Sevastapolem abundat in collibus. Floret junio. ♃.

18. S. *Sibthorpii. Sibth. n.* 56.

S. Foliis cordatis sinuatis rugosis, caule subaphyllo ramoso verticillis numerosissimis sex-floris, calycibus glandulosis; floribus parvis dilutè violaceis. Ubique in insulâ Scyro occurrit, in sylvis Bulgariæ, propè Sisopolim et Ineada. Floret junio, julio. ♃.

19. S. *verbenaca. Sp. pl.* 35. *Sibth. n.* 16. Ad sepes, circà Byzantium. ♃.

20. S. *napi-folia Wild. Sp. pl.* 1. *p.* 143. *Sibth. n.* 17. S. *verticillata. Marsch. Fl. taur. n.* 57. Horminum sylvestre latifolium verticillatum. C. B. *Herb. Tourn.* Ubique ad littora Ponti Euxini, in Colchide circà Soukoum, in Ponto propè Trapezum, propè Sevastopolem in Tauriâ, denique in vicinis Odessæ. Junio florens. ☉. In arvis Coi crescit varietas insignis foliis longioribus nunquàm lyratis magisque rugosis, floribus duplò majoribus atque calycibus saturè violaceis.

21. S. *calycina. Sibth. n.* 48.

S. orientalis, frutescens, foliis circinnatis, acetabulis moluccæ. *Tourn. Cor.* 10. formosa species et odore gratissimo. Hanc collegi in collibus apricis et maritimis insulæ Sami ad urbem *Vathi*, nec posteà vidi. Maio floret. ♄.

22. S. *sclarea. Sp. pl.* 38. *Sibth. n.* 63. In arvis insulæ Coi; maio floret. ♂.

23. S. *Æthiopis. Sp. pl.* 39. *Marsch. Fl. taur. n.* 61. Ad ruinas veteris Chersonesi, in Tauriæ collibus. ♂.

III. TRIANDRIA.

I. MONOGINIA

24. VALERIANA *sisymbrii-folia. Vahl. Sp.* 2. *p.* 17. *Desf. Cor. p.* 53. *f.* 41. *Poiret. Ency. n.* 19. V. dioscoridis. *Sibth. n.* 74.

V. orientalis, sisymbrii mathioli folio. *Tourn. Cor.* 6. *Herb. Tourn. Icon. Aubriet.*

Similis V. dioïcæ; sed distincta foliis radicalibus pinnatis, pinnis ovatis dentatis. — In montibus insulæ Coi; maio floret. ♃.

25. V. *orbiculata. Sibth. n.* 74.

V. calcitrapæ affinis, sed folia inferiora integra tantùm dentata. — Cum præcedente crescit, maio florens. ⊙

26. V. *tuberosa. Sp. pl.* 46. *Marsch. Fl. taur. n.* 66. —In Tauriæ pascuis, propè Kerch. ♃

27. FEDIA *cornu-copiæ. Gœrtner. Fruct. p.* 36. *Valeriana cornu-copiæ. Sp. pl.* 44. *Sibth. n.* 73.—In Melitâ secùs vias, ad sepes. ⊙.

28. VALERIANELLA *coronata. D. C. Fl. fr. n.* 3333. *Valeriana coronata. Wild. Sp.* 1. *p.* 184. *Sibth. n.* 79.—Crescit in segetibus insulæ Meli, in pascuis Tauriæ. ⊙.

29. V. *discoïdea. Loisel. not.* 148. *Fedia discoïdea. Vahl. en.* 2. *p.* 21. *Valeriana discoïdea. Wild. Sp.* 1. *p.* 184. *Sibth. n.* 80. — In montibus celsis insulæ Coi. ⊙.

30. V. *uncinata. Marsch. Fl. taur. n.* 72.

V. floribus triandris, caule dichotomo, foliis pinnatifidis, fructu lineari sexdentato : dentibus uncinatis.—Ad promontorium *Ack Bouroun*, in Taurià propè Kerch. ⊙.

31. V. *auricula. D. C. Fl. fr. sup. n.* 3330. (*b*). — In arvis Meli, in lazaret Theodosiæ. ⊙.

32. CROCUS *odorus. Bivona. Bernardi. Stirp. rar. Sicil. Man.* 3. *p.* 8. *f.* 2.

C. biflorus : foliis linearibus, canaliculatis, margine revolutis ; stigmato trifido incluso, segmentis apice multifidis. *Cup. pan.* 1. *f.* 7.

33. IRIS *pumila. Sp. pl.* 56. *Sibth. n.* 90.—In summo monte *Bougourlou*, propè Byzantium ad littus Asiaticum. ♃.

34. I. *pseudo acorus*. *Sp. pl.* 56. *Sibth. n.* 91.—In Colchide frequens, ad rivulos. ♃.

35. I. *sisyrinchium*. *Sp. pl.* 59. *Sibth. n.* 95.—In collibus apricis insularum Melitæ, Meli et Cimoli. Marte, aprili florens. ♃.

36. I. *ochroleuca*. *Wild. Sp.* 1. *p.* 223. *Marsch. Fl. taur. n.* 86.—In pratis Colchidis, ad arcem Soukoum-Kale. ♃.

37. SCHŒNUS *mucronatus*. *Sp. pl.* 63. *Sibth. n.* 97. —In arenis maritimis insulæ Scyri. ♃.

38. CYPERUS *longus*. *Sp. pl.* 67. *Sibth. n.* 99.

A specie vulgari planta nostra differt umbellâ polyphyllâ, multifariam decompositâ, spicis numerosis, minimis, linearibus. — Ubertim in paludosis Lernæ. ♃.

59. SCIRPUS *holoschœnus*. *Sp. pl.* 72. *Sibth. n.* 112. —In arenosis maritimis frequens; in insulis Melo, Samo, Scyro, etc. ♃

40. S. *lacustris*. *Sp. pl.* 71. *Sibth. n.* 111. — In palustribus Colchidis, circà Soukoum. ♃.

41. ECHINARIA *capitata*. *Desf. atl.* 2. *p.* 385. — *Cenchrus capitatus* *Sp. pl.* 1488. *Sibth. n.* 263. — In collibus aridis insulæ Meli, aprili floret. ☉.

42. NARDUS *aristata*. *Sp. pl.* 78. *Marsch. Fl. taur. n.* 108. — In collibus Tauriæ, propè Sevastopolem. ☉.

II. DIGYNIA.

43. AGROSTIS *miliacea*. *Sp. pl.* 91. *Milium arundinaceum*. *Sibth. n.* 152.—Frequens in udis insulæ Meli, ubi sæpè ad altitudinem 5-6 pedum assurgit. ♃.

44. A. *alba*. *Sp. pl.* 93, *Sibth. n.* 155. *Marsch. Fl. taur. n.* 140.—Circà Odessam, in pascuis ♃.

45. AIRA *caryophyllea. Sp. pl.* 97. *Sibth. n.* 168. —In collibus Meli ubique occurrit.

46. A. *canescens. Sp. pl.* 97. *Sibth. n.* 167.—In ericetis insulæ Leri ☉.

47. MELICA *ramosa. D. C. Fl. fr. n.* 1540. *M. pyramidalis. Lam. Ency.* 4. *p.* 72. *M. aspera. Desf. atl.* 1. *p.* 71. *M. saxatilis. Sibth. n.* 171. In collibus aridis insulæ Astypalææ ♃.

48. M. *caricina.* foliis longis strictis scabris acutiusculis, supernâ vaginante paniculam elongatam cærulescentem, glumis calycinis glabris acutis, sed inermibus.

Hæc planta quodammodo habitu sesleriam refert, at propter flores non verè spicatos involucrumque nullum eam cum melicis conjungo.—In pascuis Tauriæ frequens, ad littora Bosphorii Cimmeriani. ♃.

49. PHALARIS *arenaria. Smit. Fl. Br.* 62. *Sibth. n.* 128. *Phleum arenarium. Sp. pl.* 88.—In arenosis maritimis Meli. ☉.

50. P. *phleoides. Sp. pl.* 80. *Sibth. n.* 129. Circà Trapezum, in declivis. ♃.

50. (a) P. *cylindrica. D. C. Fl. fr. n.* 1493. *Loisel. Fl. Gall.* 1. *p.* 36. *P. Bulbosa. Bell. act. Tur.* 5. *p.* 213.—In collibus aridis Tauriæ, circà Sevastopolem ☉.

51. P. *crypsoïdes.*

Caule suberecto nodoso minimo basi ramoso, foliis glabris amplè vaginantibus, in discum latum abeuntibus, supernâ spicam ferè involucrante, spicâ ovatâ subrotundâ, glumis acutis carinatis compressis glaberrimis.

Valdè affinis *crypsi schœnoidi:* differt folio supremo obtuso plerumque 2-3 lineas remoto à spicâ, glumis ferè planis non acuminatis. Planta vix triuncialis; spicæ sæpius solitares

terminales. — In scopulo *Raphti* ad littus Atticum ⊙.

52. PHLEUM *nodosum. Sp. pl.* 88. *Sibth. n.* 142.— In Tauriæ pascuis, in nemoribus Bulgariæ ϰ.

53. ALOPECURUS *agrestis. Sp. pl.* 89.

A specie vulgari nostra tantulùm recedit aristis brevioribus et culmis in cespite confertis. In Ponto, circà Trapezum frequens. Junio ϰ.

54. A. *utriculatus. Sibth. n.* 147. *Persoon. Syn.* 1. *pl.* 80. —*Phalaris utriculata. Sp. pl.* 80. Copiosus circà Byzantium; maio florens ⊙.

55. LAMARCKIA *aurea. Mœnch. met.* 201. *D. C. Fl. fr. n.* 1537. *Cynosurus aureus. Sp. pl.* 107. *Sibth. n.* 205.—In collibus saxosis Meli et Cimoli, in summo monte Bougourlou propè Bizantium. ☉

56. POLYPOGON *vaginatus. Persoon. Syn.* 1. *p.* 80. *Alopecurus vaginatus. Wild. nov. act. Ber.* 3. *Marsch. Fl. taur.* 123.—In pascuis Tauriæ propè urbem Kerch copiosè crescit. ϰ

57. PANICUM *viride. Sp. pl.* 83. *Sibth. n.* 135.— In lazaret Odessæ. ☉

58. P. *repens. Sp. pl.* 87. *Sibth. n.* 140.—Milii species ex insulâ Seripho. *Gundelsheimer in Herb. Tourn.* —Ad rivos Argolidis, propè ruinas Tyrinthis, augusto collegi. ϰ

59. P. *crus-galli. Sp. pl.* 83. *Sibth. n.* 136. — In umbrosis Bulgariæ, ad pagum Ineada. ☉

60. CYNOSURUS *cristatus. Sp. pl.* 105. *Sibth. n.* 201. — In pratis Colchidis, ad arcem Soukoum-Kale. ϰ

61. C. *echinatus. Sp. pl.* 105. *Sibth. n.* 202.—Cum præcedente. ☉

62. DACTYLIS *Hispanica. D. C. Fl. fr. n.* 1642. (a) —In Tauriâ, circà oppidum Kerch. ♃

63. POA *littoralis. Vahl. Symb.* 2. *p.* 19. *Dactylis littoralis. Wild. Sp.* 1. *p.* 408. *Festuca littoralis. Sibth. n.* 213. — In arenosis maritimis insulæ Sami copiosè crescit. ♃

64. P. *divaricata. Wild. Sp.* 1. *p.* 402. *Sibth. n.* 183 — In maritimis insulæ Melitæ. ☉

65. P. *bulbosa. Var. vivipara. Sp. pl.* 102. — In Theodosiæ lazaret. ♃

66. P. *dura. Sibth. n.* 181. *Marsch. Fl. taur. n.* 264. *Cynosurus durus. Sp. pl.* 105. — Circà Byzantium in monte Bougourlou, in Lazaret Theodosiæ. ☉

67. BRYZA *spicata. Sibth. n.* 199.

B. spiculis ovatis erectis quinque vel septem floris, calycibus parùm concavis, paniculâ subspicatâ erectâ. —In rupibus insulæ Coi nascitur, ad altitudinem 2-3oo hexapodum. ☉

68. B. *virens. Lam. Illust. n.* 1011. *D. C. Fl. fr. n.* 1627. —Forsàn species distincta foliis latis planis et radice perenni? — In graminosis circa Trapezum. ♃

69. B. *humilis. Marsch. Fl. taur. n.* 167. — Frequens in Tauriæ collibus, circà Kerch. ☉

70. FESTUCA *inermis. D. C. Fl. fr. n.* 2581. *Bromus inermis. Marsch. Fl. taur. n.* 183. — In lazaret Odessæ altitudinem 7-8 pedum attingens. ♃

71. F. *ovina. Sp. pl.* 108. *Sibth. n.* 206. *Marsch. Fl. taur. n.* 173. —In Tauriæ pascuis copiosissima. ♃

72. F. *sylvatica. Villars. Dauph.* 2. *p.* 105. *D. C. Fl. fr. n.* 1577. *Buxb. C.* 5. *App. n.* 20. *Malè.* — In umbrosis Colchidis ubique junio crescit. ♆

73. F. *serotina. Sp. pl.* 111. *D. C. Fl. fr. n.* 1574. — In collibus propè Thessalonicam. ♃

74. F. *ciliata. D. C. Fl. fr. n.* 1595. — In maritimis Meli. ○

75. F. *myurus. Sp. pl.* 109. *Sibth. n.* 211. — In pratis Colchidis. ⊙

76. BROMUS *mollis. Sp. pl.* 112. *Sibth. n.* 216. — Reperitur in Tauriæ atque Colchidis graminosis. ♂

77. B. *rubens. Sp. pl.* 114. *Sibth. n.* 220. — Frequens in arvis Insulæ Meli. ♂

78. B. *tectorum. Sp. pl.* 114. *Sibth. n.* 219. — Ubique in pascuis Tauriæ. ♂

79. B. *asper. Lin. Sup.* 111. *Sibth. n.* 217. — In umbrosis Colchidis. ♂

80. B. *erectus. Huds. Angl.* 49. *D. C. Fl. fr. n.* 1633. B. *angusti-folius. Marsch. Fl. taur. n.* 184. B. *perennis. Villars.* 1. *Dauph.* 2. *p.* 122. — In pascuis Tauriæ. ⊙

81. KŒHLERIA *cristata. Persoon. Syn.* 1. *p.* 97. *Aira cristata. Sp. pl.* 94. *Sibth. n.* 163. *Dactylis cristata. Marsch. Fl. taur. n.* 169.

82. K. *phleoïdes. Persoon. Syn.* 1. *p.* 97. *Festuca phleoïdes. Villars.* 1. *Dauph.* 2. *p.* 95. *Desf. atl.* 1. *p.* 90. — In insulâ novâ Camini, ad latus Vulcani. ⊙

83. LAGURUS *ovatus. Sp. pl.* 119. *Sibth. n.* 239. — In littoribus Meli haud rara. ⊙

84. STIPA *tortilis. Desf. atl.* 1. *p.* 99. *Stipa paleacea. Wild. Sp.* 1. *p.* 441. *Sibth. n.* 231. Gramen avenaceum, supinum, minus, spicâ densissimâ, cum longissimis aristis lanuginosis, fertilibus. *Herb. Tourn.* — In collibus apricis Melitæ, Meli etc. aprili. ⊙

85. S. *aristella. Lin. Syst.* 3. *p.* 229. *Sibth. n.* 232. —In declivis insulæ Scyri. ♃

86. S. *pennata. Sp. pl.* 115. *Sibth. n.* 227.—In pascuis Tauriæ frequens, propè urbem Kerch. ♃

87. S. *juncea. Sp. pl.* 116. *Sibth. n.* 229. — Circà Odessam frequens. ♂

88. AVENA *sterilis. Sp. pl.* 118. *Sibth. n* 234.—In agris insulæ Meli. ☉

89. A. *pratensis. Sp. pl.* 119. *Sibth. n.* 237.—Circà Kerch, in Tauriæ collibus. ♃

90. A *fragilis. Sp. pl.* 119. *Sibth. n.* 236. — Circà Byzantium, in agris Asiæ minoris. ☉

91. A. *pumila. Desf. atl.* 1. *p.* 103. *Persoon. Syn.* 1. *p.* 101.—Ad margines viarum insulæ Melitæ. ☉

92. CALAMAGROSTIS *epigeios. Roth. germ.* 2. *p.* 1 *D. C. Fl. fr.* 1529 (*a*). *Arundo epigeios. Sp. pl.* 120. *Marsch. Fl. taur. n.* 200.—Circà Soukoum in Colchidis nemoribus, in collibus propè Odessam. ♃

93. SACCHARUM *cylindricum. Sibth. n.* 124. *Lagurus cylindricus. Sp. pl.* 120. — In arenosis Colchidis, circà arcem Soukoum-kale. ♃

94. ROTTBOLLA *incurvata. Lin. Sup.* 114. *Sibth. n.* 248.—In collibus apricis insulæ Astypalææ. ☉

95. ÆGYLOPS *cylindrica. Sibth.* 252. *Æ. caudata. Lam. Ency.* 2. *p.* 346. *non Linnæi.*—Gramen Creticum, spicâ gracili, in duas aristas longissimas et asperas abeunte. *Tourn. Cor.* 39. *Gundelsheimer in Herb. Tourn.*—In agris aridis insulæ Leri, nec aliorsùm reperi. Maio. ☉

96. *Æ. comosa. Sibth.* 251 ? *Æ. cylindrica. Lam. Ency.* ?—Ad sepes insulæ Leri. ☉

97. ELYMUS *sabulosus. Marsch. Fl. Taur. n.* 207. Ab *E. arenario* differt spicis foliisque latioribus, rachi calycibusque glabris. — Ad littora Ponti-Euxini, propè lazaret Kerch ; maio. ♃

98. HORDEUM *bulbosum. Sp. pl.* 125. *Sibth. n.* 256. H. *strictum. Desf. atl.* 1. *p.* 113.—Gramen Creticum, spicatum, secalinum, altissimum, radice tuberosâ. *Herb. Tourn.* — In summis montibus insulæ Coi copiosè, ad sepes agrorum circà Byzantium. Maio. ♃

99. H. *jubatum. Sp. pl.* 126. H. *crinitum. Desf. atl.* 1. *p.* 113. *Elymus crinitus. Schreb. Gram.* 2. *p.* 15. *Sibth. n.* 254. *Buxb. Cent.* 1. *t.* 52. *f.* 1.—In collibus insulæ Meli, at infrequens. ☉

100. H. *murinum. Sp. pl.* 126. *Sibth.* 257. — In pascuis Theodosiæ. ☉

101. SECALE *glaucum.* Culmis foliosis, foliis striatis glaberrimis, superno spicam vaginante, spicâ clongatâ compressâ, calycibus bifloris appressis, squamis calycinis setaceis floribus saltem triplò longioribus, glumis glabris nitidis, exteriore basi ciliatâ abeunte in aristam longissimam sæpius 3-4 uncialem.

Planta in hoc genere spectabilis. Ex eâdem radice plurimi nascuntur culmi 1-2 pedales, omninò glabri glauci atque foliosi. Spicæ 3-4 unciales ferè hordeum bulbosum referunt, sed squamæ calycinæ tantùm binæ reperiuntur. Corollæ gluma exterior producitur in aristam longissimam sensim ciliatam. Hoc secale in littore maris Nigri reperi, propè lazaret urbis Kerch ad fretum Cimmerianum. Maio floret. ♃

102. S. *Orientale. Sp. pl.* 124. *Triticum orientale. Marsch. Fl. taur. n.* 218.—Gramen Armenum, secalinum, spicâ brevi et latâ. *Herb. Tourn.* — In Tauriæ pascuis frequentissimum, propè urbem Kerch. Maio. ☉

103. S. *villosum. Sp. pl.* 124. *Sibth. n.* 255.—*Triticum villosum. Marsch. Fl. taur. n.* 216.—In lazaret Theodosiæ, ad sepes circà Byzantium. ⊙

104. TRITICUM *cristatum. Persoon. Syn.* 1. *p.* 109. *Marsch. Fl. taur. n.* 220. — In Tauriæ pascuis copiosè, ad promontorium Ack-Bouroun ; circà Sevastopolem. ⊙

105. T. *imbricatum. Marsch. Fl. taur. n.* 222. — Præcedentis, ut puto, mera varietas. — Circà Sevastopolem crescit. ⊙

106. T. *ciliatum. D. C. Fl. fr. n.* 1666. *Bromus distachyos. Sp. pl.* 115. *Sibth. n.* 226. *Marsch. Fl. taur. n.* 190. — In Tauriæ collibus. ⊙

107. T. *repens. Sp. pl.* 128. *Sibth. n.* 260. *Marsch. Fl. taur. n.* 224. — In lazaret Theodosiæ et Odessæ frequens. ♃

108. T. *junceum. Sp. pl.* 128. *Sibth. n.* 259. *Marsch. Fl. taur. n.* 223.— Circà Odessam, in declivis. ♃

III. TRIGYNIA.

109. HOLOSTEUM *umbellatum. Sp. pl.* 130. *Sibth. n.* 267. — Ad muros propè Theodosiam. ⊙

110. POLYCARPON *tetraphyllum. Sp. pl.* 131. *Sibth. n.* 268. — In agris Meli, in cratere vulcani Novæ Camini propè Theram. ⊙

IV. TETRANDRIA.

I. MONANDRIA.

111. SCABIOSA *Transylvanica. Sp. pl.* 141. *Sibth. n.* 275. *Marsch. Fl. taur. n.* 238. — In sepibus Lesbi, in arvis Bulgariæ frequens. ⊙

112. S. *decurrens. Sibth. n.* 274. S. *uralensis ? Marsch. Fl. taur. n.* 235.

S. orientalis, foliis centaurii majoris glabris et rigidis. *Tourn. Cor.* 34. *Herb. Tourn.*—Propè Odessam, in pascuis. Julio. ♃

113. S. *integri-folia. Sp. pl.* 142. *Sibth. n.* 280. — In umbrosis summæ insulæ Coi. ⊙

114. S. *micrantha. Desf. Ann. mus. n.* 11. *p.* 168. *t.* 25.

S. orientalis, villosa, flore suavè rubente, fructu pulchro oblongo. *Cor. Inst.* 35. — Habitat in pascuis Tauriæ. ⊙

115. S. *columbaria. Sp. pl.* 143. *Sibth. n.* 283. — Planta nostra infernè pilis griseis tota tegitur. — In arvis Bulgariæ, propè Ineada. Junio. ♃

116. S. *gramuntia. Sp. pl.* 143. — In collibus apricis circà Sevastopolem frequens. Junio floret. ♃

117. S. *Ukranica. Sp. pl.* 144. *Marsch. Fl. taur. n.* 245. — Planta tota candicans. — Copiosè crescit in apricis Tauriæ, circà Sevastopolem. Junio floret. ♃

118. S. *argentea. Sp. pl.* 145. *Sibth. n.* 288. *Desf. Cor. p.* 52. *t.* 39.

S. orientalis argentea, foliis inferioribus incisis. *Tourn. Cor.* 34. Circà Thessalonicam, in collibus haud rara. ♃

119. KNAUTIA *Orientalis. Sp. pl.* 146. *Sibth. n.* 298. — In nemoribus Bulgariæ, in agris incultis insulæ Leri. Maio, junio. ⊙

120. K. *plumosa. mant.* 319. *Scabiosa plumosa. Sibth. n.* 293. – Scabiosa Cretica, capitulo pappos men

tiente. *Tourn. Cor.* 34. *Herb. Tourn.* — In insulâ Samo reperitur : maio floret. ☉

121. SHERARDIA *arvensis. Sp. pl.* 149. *Sibth. n.* 299.—Ad sepes, in arvis insulæ Meli. ♃

122. S. *muralis. Sp. pl.* 149. *Sibth. n.* 300. propè Trapezum suprà veteres muros. ☉

123. ASPERULA *cynanchica. Sp. pl.* 151. *Sibth. n.* 309.—In pascuis Odessæa bundat julio. ♆

124. A. *longi-flora. Waldst et Kitaib. pl. Rar. Hon.* 2. *p.* 162. *t.* 150. *Bertoloni. Amæn. Ital. p.* 337. — Caulis altior, corollæ tubus duplò longior quàm in præcedente. — In lazaret Odessæ. Julio. ♃

125. A. *littoralis. Sibth. n.* 311.

A. foliis linearibus quaternis margine cauleque scabris ferè incanis, floribus quadrifidis pilosis, fructu hispido. —Circà Sevastopolem, in collibus maritimis copiosè crescit. Floret junio. ♃

126. A. *humifusa. Marsch. Fl. taur. sup. n.* 256.

A. foliis senis linearibus reflexo-patentibus cauleque ramosissimo prostrato villosis, corollæ subcampanulatæ tubo brevi.

Tubi longitudine tàm vicina Galiorum quàm Asperularum. — Circà Theodosiam, in ruderatis valdè frequens. Junio floret. ♃

127. GALIUM *glaucum. Sp. pl.* 156. *Sibth. n.* 326. *Lam. Ency.* 2. *p.* 579. G. *campanulatum. Villars. Daup.* 2. *p.* 326. *Asperula galioïdes. Marsch. Fl. taur. n.* 256. — In pascuis Odessæ. Julio florens. ♃

128. G. *incurvum. Sibth. n.* 323?

G. caule basi ramoso nitido, geniculis tumidis, foliis octonis linearibus glabris aristatis deflexis incurvis, flori-

bus paniculats, corollâ obtusâ muticâ. — In collibus petrosis insulæ Sami, ad ruinas veteris urbis floret maio. ♃

129. G. *Græcum. Lin. mant.* 38. *Sibth. n.* 334.— Aparine Cretica, saxatilis, incana, tenuifolia. *Herb. Tourn.*—In fissuris rupium insulæ Coi. Maio floret. ♃

130. G. *floribundum. Sibth. n.* 331. *an.* G. *setaceum*? *Desf. atl.* 1. *p.* 129.—Ut Sibth. variat fructu piloso et glaberrimo, nostrum glaberrimum. Cæterùm omninò facies et habitus G. setacei. *Desf.*— In aridis insulæ Astypalææ. Maio floret. ⊙

131. G. *verum. Sp. pl.* 155. *Sibth. n.* 324. Planta nostra exactè media inter. G. *verum.* L. et G. *Tunetanum. Desf.* hujus habitum et inflorescentiam habet; sed cùm glabra sit in cunctis partibus, eam ad primam speciem refero.—In arenis maritimis insulæ Sami, haud procùl fani Junonis. Junio floret ♃

132. G. *palustre. Sp. pl.* 153. G. *satureiœ folium*? *Marsch. Fl. Taur. Sup. n.* 260.—Ad rivulos Colchidis, propè Soukoum. ♃

133. G. *micranthum.* Caule procumbente debili ramoso glabro; foliis subsenis ovatis oblongis basi angustatis, pedunculis axillaribus hirsutis deflexis trifloris, fructu minimo hispido.

An Galii seu Valantiæ species?—Ad marginem Vulcani insulæ novæ Camini propè Theram.⊙

134. G. *microcarpon. Wahl. Symb.* 2. *p.* 30.?

G. caule lævi herbaceo, foliis subsenis, inferioribus oblongis, superioribus setaceis, pedunculis trifidis, fructibus hispidis.—In summis montibus insulæ Coi. ⊙

135. G. *rubrum. Sp. pl.* 156? — Nostrum recedit à specie L. foliis duplò longioribus, pediculis paululùm lon-

gioribus sæpè dichotomis atque fructibus duplò minoribus. — In sylvis Bulgariæ frequens, propè Ineada.

136. VALANTIA *Chersonensis. Marsch. Fl. taur. n.* 1977. — Ad sepes, circà Byzantium frequens. Maio. ☿

137. V. *hispida. Sp. pl.* 1490. *Sibth. n.* 336. — In apricis insularum Meli, Leri, etc. Maio. ☉

138. V. *Taurica. var. hirsuta. Marsch. Fl. taur. n.* 1976.—Propè lazaret Sevastopoles frequentissima. ☿

139. CRUCIANELLA *aspera. Marsch. Fl. taur. n.* 271.—Circà Thessalonicam, in collibus aridis. ☿

140. C. *lati-folia. Sp. pl.* 158. *Sibth. n.* 338.—In summis montibus insulæ Coi. ☉

141. RUBIA *lucida. Lin. Syst.* 2. *p.* 732. *Sibth. n.* 342.—In insulâ Lesbo ad sepes nascitur. Junio. ☿

142. R. *tenuifolia.* Caule basi fruticoso humifuso, angulis tantùm asperis minimè spinosis, foliis lævibus ovatis subsenis apice mucronatis; pedunculis axillaribus ramosis.

Facilè distinguitur caule frutescente, foliis floribusque duplò minoribus quàm in præcedente.

R. Cretica frutescens, tenuifolia. *Tourn. Cor.* 4. *Herb. Tour.*—Habitat in summis montibus insulæ Coi, ad altitudinem 400 hexapodum. Maio ineunte. ♄

143. PLANTAGO *media. Sp. pl.* 163. *Sibth. n.* 346. *Marsch. Fl. taur. n.* 275.—Varietas notanda foliis lanceolatis erectis, scapis pubescentibus sub spicâ ferè incanis. Forsàn species distincta? — Habitat in pascuis Tauriæ, propè Kerch. ☿

144. P. *lanceolata. Sp. pl.* 164. *Sibth. n.* 347.—In Colchide frequens, ad arcem Soukoum-Kale. ☿

145. P. *amplexicaulis. Cav. ic. tab.* 125. *Wild. Sp.*

1. *p.* 650. — In insulâ Astypalæâ, ad fossas frequens. Floret maio. ☉

146. P. *albicans*. *Sp. pl.* 165. *Sibth. n.* 349. — In insulis Archipelagi haud rara crescit. ♃

147. P. *maritima*. *Sp. pl.* 165. *Sibth. n.* 353. — In maritimis insulæ Meli. ♃

148. P. *serraria*. *Sp. pl.* 166. *Sibth. n.* 356. — P. angusti-folia serrata hispalensis, C. B. *Herb. Tour.* — Ad margines viarum in insulâ Melitâ nec alibi reperi. ♃

149. EPIMEDIUM *Alpinum*. *Sp. pl.* 171. *Sibth. n.* 364. *E. alpinum*. *Var. pubigerum*. *D. C. Syst. un. t.* 2. *p.* 29. — Abundat in nemoribus circà Byzantium, ad pagum Therapia. ♃

150. CORNUS *mascula*. *Sp. pl.* 171 *Sibth. n.* 365. Circà Byzantium frequens, necnon in sylvis Colchidis. ♄

151. C. *sanguinea*, *Sp. pl.* 171. *Sibth. n.* 366. — In lazaret Kerch, ad Bosphorum Cimmerianum. ♄

152. ELÆAGNUS *angustifolia*. *Sp. pl.* 176. *Sibth. n.* 369. — In arvis Athenarum frequens, in insulâ Melo. ♄

II. DIGYNIA.

153. HYPECOUM *procumbens*. *Sp. pl.* 181. *Sibth. n.* 377. — In maritimis insulæ Meli; maio florens. ☉

III. TETRAGYNIA.

154. SAGINA *procumbens*. *Sp. pl.* 185. *Sibth. n.* 388. — Ad margines viarum, in insulâ Melitâ communis. ☉

V. PENTANDRIA.

I. MONOGYNIA.

155. HELIOTROPIUM *supinum*. *Sp. pl.* 187. *Sibth. n.* 391.

H. minus, supinum. C. B. *Herb. Tourn.*—In arvis insulæ Leri collegi. Junio floret. ⊙

156. MYOSOTIS *perennis*. M. *scorpioïdes Var. b. Sp. pl.* 188. *Sibth. n.* 392. M. *perennis. Var. a. palustris. D. C. Fl. fr.* 2725. — Ad rivulos in Colchide frequens. ♃

157. M. *arvensis*. M. *scorpioïdes. Var. a. Sp. pl.* 188. *Sibth. n.* 392. M. *arvensis. Var. b. collina. D. C. Fl. fr. n.* 2724.—In collibus aridis insulæ Meli. ⊙

158. M. *lappula. Sp. pl.* 189. *Sibth. n.* 294. *Marsch. Fl. taur. n.* 305.—In pascuis Tauriæ, propè Theodosiam et Kerch, copiosissimè. ⊙

159. LITHOSPERMUM *apulum. Sibth. n.* 395. *myosotis apula. Sp. pl.* 189.—In collibus inculiis insulæ Meli non rarum occurrit. Maio floret. ⊙

160. L. *arvense. Sp. pl.* 190. *Sibth. n.* 398.—Commune in pascuis Tauriæ.

161. L. *officinale. Sp. pl.* 189. *Sibth. n.* 397.—Cum præcedente, nec rarius. ♃

162. L. *fruticosum. Sp. pl.* 190. *Sibth. n.* 400.—Abundat in collibus apricis insulæ Sami. ♄

163. L. *dispermum. Lin. dec.* 1. *t.* 7. *Marsch. Fl. taur. n.* 312.—In pascuis Tauriæ, circà Kerch frequens. ⊙

164. ANCHUSA *angusti-folia. Sibth. n.* 405. *Wild. Sp.* 1. *p.* 757. *non. D. C. Fl. fr. n.* 2730. — In arvis insulæ Meli vulgaris. ♃

165. A. *undulata. Sp. pl.* 191. *Sibth. n.* 406. Buglossum Lusitanicum, echii folio undulato. *Herb. Tourn.* —Copiosè creseit in arenis maritimis insularum Meli, Coi, Sami, Lesbi etc. Floret maio. ♃

166. A. *lineari-folia*. A. *angustifolia*? *D. C. Fl. fr. n.* 273.

A. foliis angustis ferè linearibus callosis hispidis, floribus racemosis approximatis fauce squamosis, calycibus quinque costatis usque medium divisis, bracteis ovatis acuminatis.

Flores amœnè cœrulei. — In pascuis Odessæ nascitur frequens. Julio florens. ♃

167. A. *tinctoria. Sibth. n.* 408. *Desf. Atl.* 1. *p.* 156. *Lithospermum tinctorium. D. C. Fl. fr. n.* 2716. — In summis montibus insulæ Coi. Floret maio. ♃

168. CYNOGLOSSUM *pictum. Wild. Sp.* 1. *p.* 761. *D. C. Fl. fr. n.* 2738. *March. Fl. taur. n.* 324. — In Tauriæ pascuis, propè Kerch. ☉

169. SYMPHYTUM *Orientale. Sp. pl.* 195. Symphytum Constantinopolitanum, borraginis facie et folio, flore albo. *Tour. Cor.* 7. *Buxb. C.* 5. *p.* 36. *t.* 68. *Herb. Tourn.* — Circà Byzantium, in locis humidis nimium frequens. Aprili floret. ♃

170. S. *asperrimum. March. Fl. taur. n.* 328. Symphytum Ibericum, folio subrotundo aspero, flore cœruleo. *Tourn. Cor.* 7. *Gundelsheimer in Herb. Tour.* — Occurrit frequens in umbrosis summæ insulæ Coi. Maio florens. ♃

171. CERINTHE *aspera. Sibth. n.* 418. C. *major. b. Sp. pl.* 196. — Ad margines agrorum, in insulâ Samo. ☉

172. ONOSMA *erecta. Sibth. n.* 424?

O. foliis linearibus, pilis basi stellatis longis rigidis intertextis, caulibus ramosis floribusque erectis.

Symphytum creticum, echii folio angustiore, longissimis villis horrido, radice rubrâ, flore croceo. *Tourn. Cor.*

6. *Herb. Tourn. Icon. Aubriet.*—In collibus elatis insulæ Meli. Aprili floret. ♃

173. O. *rupestris. Marsch. Fl. taur. n.* 332.—Symphytum armenium, echiifolio, flore albo tenuissimo. *Tourn. Cor.* 6. *Herb. Tourn.*—Copiosè crescit in collibus circà Trapezum. Floret junio. ♃

174. O. *echioïdes. Sp. pl.* 197. *Sibth. n.* 423.—In montibus elatis insulæ Coi, ad altitudinem 300 hexapodum. Floret maio. ♃

175. O. *tinctoria. Marsch. Fl. taur. n.* 331.—Præcedenti similis, sed folia longiora et angustiora. Flores minores, planta integra obscurè virens.—In Tauriæ pascuis propè urbem Kerch. ♃

176. O. *stellulata. Marsch. Fl. taur. n.* 333.—Symphytum ponticum, oleæfolio cinereo et hirsuto. *Herb. Tourn.*—In collibus apricis Tauriæ, ad ruinas veteris Chersonesi. ♆

177. BORRAGO *Orientalis. Sp. pl.* 197. *Sibth. n.* 427. *Buxb. C.* 5. *f.* 30.—In nemoribus circà Byzantium copiosissimè reperitur. Florens maio. ♃

178. B. *Cretica. Desf. Cor.* 5. *t.* 30. *Sibth. n.* 428. B. cretica, flore reflexo elegantissimo suavè rubente. *Tourn. Cor.* 6. *Herb. Tourn.*—In fissuris rupium insulæ Astypalææ nec alibi mihi occurrit in Oriente. Floret maio. ♃

179. ASPERUGO *procumbens. Sp. pl.* 198. *Sibth. n.* 429. Frequens in pascuis Tauriæ, propè Kerch ☉

180. LYCOPSIS *variegata. Sp. pl.* 198. *Sibth. n.* 430.—In ruderibus insulæ Astypalææ, nec alibi reperi. Maio floret. ☉

181. L. *glomerata*. Foliis et caule strigosis, foliis angustis sessilibus integris, caule patulo ramoso, floribus minimis confertis ferè capitatis, calycibus quinque partitis undique tectis pilis longis strcitis et incanis.

Flores amœni violacei seu purpurei. —Ad littus arenosum insulæ Coi nec rursùs inventi. Maio floret. ☿

182. L. *erecta*. *Anchusa stylosa*? *Marsch. Fl. taur. n.* 315. A. *annua*. *Pallas*.—Buglossum orientale erectum, foliis undulatis, flore amœnè cœruleo. *Tourn. Cor.* 6. Ex descriptione.

L. floribus æqualibus, calycibus quinque partitis, corollæ tubo brevioribus, fructiferis erectis, foliis undulato-dentatis hispidis.—In pascuis Theodosiæ. Maio. ☉

183. ECHIUM *Creticum*. *Sp. pl.* 200. *Sibth. n.* 438.

E. creticum angusti-folium rubrum. *Tourn. Inst.* 136. *Herb. Tourn.*—Cùm priori in arenis maritimis insulæ Coi, nec alibi. ☿

184. E. *Pyrenaïcum*. *Lin. Mant.* 334. *Desf. Fl. atl.* 1. *p.* 165. *D. C. Fl. fr. n.* 2708.—Circà Trapezum copiosissimè. Junio. ☿

185. E. *flavum*. *Desf. Fl. atl.* 1. *p.* 165—Frequens in nemoribus Bulgariæ, ad pagum Ineada. Floret julio. ☿

186. E. *plantagineum*. *Lin. Mant.* 102. *Sibth. n.* 432.—Circà Byzantium in agris. ☉

187. E. *vulgare*. *Sp. pl.* 200. *Sibth. n.* 434. —In Colchide vulgaris, circà arcem Soukoum-Kale. ♂

188. E. *violaceum*. *Lin. Mant.* 42. *D. C. Fl. fr. n.* 2709. — In arenosis insulæ Meli haud rarum. Floret aprili. ☉

189. E. *calycinum*. *Loisel. not.* 38. *D. C. Fl. fr.*

n. 2711 (a). E. *prostratum. Tenore. Fl.* 1. *p.* 50. *f.* 12. E. *Lusitanicum. Allion. ped. n.* 182. — Frequentissimè occurrit in arenosis littoribus insularum Melitæ et Meli. ♂

190. ANDROSACE *maxima. Sp. pl.* 203. *Marsch. Fl. taur. n.* 342.—In collibus Theodosiæ frequentissima. Maio. ⊙

191. CYCLAMEN *hederi-folium. Aiton. Hort. Kew.* 1. *p.* 196. *Sibth. n.* 444. In montibus insulæ Scopeli copiosè : septembri. ♃

192. LYSIMACHIA *verticillata. Marsch. Fl. taur. n.* 355.

L. pontica, lutea, canescens et villosa. *Guldenstæi mer in Herb. Tourn.*—Ad margines sylvarum abundat in Colchide, circà Soukoum. Junio florens. ♃

193. L. *linum stellatum. Sp. pl.* 211. *Sibth. n.* 451. —In apricis insulæ Meli. Aprili. ⊙

194. CONVOLVULUS *scammonia. Sp. pl.* 218. *Sibth. n.* 459. *Marsch. Fl. taur. n.* 365.—Suprà sepes scandens, in insulâ Coo : maio floret. ♃

195. C. *hirsutus. Marsch. Fl. taur. Suppl. n.* 365. C. *sagitti-folius. Sibth. n.* 461.

C. foliis cordato-hastatis pilosis basi angulatis, pedunculatis elongatis uni seu bifloris, bracteis binis remotis filiformibus, calyce brevi hirsuto, flore albo amplo.

In ruderatis Sami, florens junio. ♃

196. C. *althæoïdes. Sp. pl.* 222. *Sibth. n.* 462. *Var. nana.* Insignis quia ferè acaulis, vix 3-4 uncialis, foliis tenuè dissectis, pedunculis semper unifloris.—In arenosis maritimis insulæ Meli. Aprili, maio. ♃

197. C. *oleæfolius. Lamarck. Ency. 3. p.* 552. C. *lineatus. Sibth. n.* 467.

C. argenteus angusti-folius umbellatus, partim erectus, partim supinus. *Tourn. Cor.* 1. *Herb. Tourn.* — Prope Cimolum in scopulo St.-Istad copiosissimus suffrutex. Floret aprilis fine. ♄

198. C. *Cantabrica. Sp. pl.* 225. *Sibth. n.* 469. — Frequens in collibus Bulgariæ, necnon circà Trapezum. ♃

199. C. *soldanella. Sp. pl.* 226. *Sibth. n.* 474. Vulgaris in littoribus arenosis Colchidis. Junio. ♃

200. C. *arvensis. Sp. pl.* 218. *Sibth. n.* 457.—Ad sepes Colchidis, in pascuis Odessæ communis. ♃

201. CAMPANULA *stricta. Sp. pl.* 238. *Sibth. n.* 488.—In montibus elatis insulæ Coi. Maio floret. —

202. C. *Sibirica. Sp. pl.* 236. *D. C. Fl. fr. n.* 2855*.

C. iberica, foliis incisis, flore minimo et multiplici. *Gundelsheimer in Herb. Tourn.* — In herbidis propè Odessam. ♂

203. C. *dichotoma. Sp. pl.* 237. *Sibth. n.* 492. — In summis rupibus insulæ Coi. Maio floret. ☉

204. C. *speculum. Sp. pl.* 238. *Sibth. n.* 498. — In insulâ Coo ubique frequens. ☉

Varietatem legi notandam; caulibus et foliis scabris, caule plerumque simplici, vix 3-4 unciali adscendente, foliis oblongis sessilibus sinuatis crispis numerosis ferè imbricatis, corollâ albâ calyce saltem duplò longiore. An species distincta? — In arenis maritimis ejusdem insulæ. Floret maio. ☉

205. THESIUM *ramosum. Marsch. Fl. taur. n.* 439. T. *linophyllum. Sp. pl.* 301. — In herbidis Tauriæ frequentissimè, circà Kerch. ♃

206. T. *humile. Vahl. Symb.* 3. *p.* 43.

T. foliis linearibus glaucis subcarnosis, floribus axillaribus sessilibus, nucibus globosis rugosis, caule basi ramoso.—In arvis maritimis insulæ Meli; aprili floret. ⊙

207. AZALEA *Pontica. Marsch. Fl. taur. n.* 361. Chamærhododendros pontica maxima, mespili folio, flore luteo. *Tourn. Cor.* 42. *Buxb. c.* 5. *p.* 36. *f.* 69. *Icon. Aubriet.*—Cum Rhododendro pontico et Vaccinio arcto-staphylo nemora densa efficit circà Trapezum. Maio floret. ♄

208. VERBASCUM *phlomoïdes. Sp. pl.* 253. *Sibth. n.* 522. Frequens in collibus aridis insulæ Sami. ♂

209. V. *pulverulentum. D. C. Fl. fr. n.* 2673. — In incultis insulæ Leri copiosè crescit. ♂

210. V. *gnaphalodes. Marsch. Fl. taur. n.* 399.** —Planta 5-6 pedalis, foliis amplissimis dentatis utrinque tomentosis, ramis patentibus, floribus luteis in spicis densis cano-tomentosis.—In arenis maritimis Colchidis, ad arcem Soukoum-Kale. ♂

211. V. *lychnitis. Sp. pl.* 253.—Vulgaris in campis circà Trapezum. ♃

212. V. *pinnatifidum. Vahl. Symb.* 2. *p.* 39. *Sibth. n.* 526. — In littoribus arenosis insulæ Scyri. Julio floret. ♃

213. DATURA *stramonium. Sp. pl.* 255. *Sibth. n.* 530. *Marsch. Fl. taur. n.* 407.— In Colchide, circà Soukoum. ⊙

214. HYOSCIAMUS *niger. Sp. pl.* 257. *Sibth. n.* 531.—Propè Byzantium frequens, circà Soukoum Colchidis, Theodosiam et Kerch Tauriæ, in lazaret Odessæ. ♂

215. ATROPA *mandragora*. *Sp. pl.* 259. *Sibth. n.* 534. Astypalææ campos infestat. ♃

216. PHYSALIS *alkekengi*. *Sp. pl.* 262. *Sibth. n.* 537.—In sylvis Bulgariæ, ad pagum Ineada. ♃

217. RHAMNUS *oleoïdes*. *Sp. pl.* 279. *Sibth. n.* 548. R. hispanicus, oleæfolius. *Tourn. Inst.* 593. *Herb. Tourn.*— In insulis Melo et Cimolo copiosè. ♄

218. R. *frangula*. *Sp. pl.* 280. *Sibth. n.* 553. *Marsch. Fl. Taur. n.* 420.— In sylvis Colchidis frequentissimè, propè Soukoum. ♄

219. PALIURUS *aculeatus*. *D. C. Fl. fr. n.* 4081. *Rhamnus paliurus*. *Sp. pl.* 281. *Ziziphus paliurus*. *Sibth. n.* 555.— Copiosissimus circà Trapezum, in insulâ Thaso, in peninsulâ Montis Athonis. Junio floret. ♄

220. LAGOECIA *cuminoïdes*. *Sp. pl.* 294. *Sibth. n.* 563.—In insulis Melo et Cimolo ubique reperitur. Maio florens. ☉

221. VIOLA *canina*. *Sp. pl.* 1324. *Sibth. n.* 509. —In collibus insulæ Meli haud rara. ♃

222. V. *arvensis*. *D. C. Fl. fr. n.* 4469. V. *tricolor*. a. *Sp. pl.* 1326. *Sibth. n.* 510. *Marsch. Fl. taur. n.* 433. In lazaret Theodosiæ communis. ☉

223. PARONYCHIA *echinata*. *D. C. Fl. fr. n.* 2285. *Illecebrum echinatum*. *Desf. atl.* 1. *p.* 204.—In insulâ Melo, circà Theatrum vetus. Aprili floret. ☉

224. P. *argentea*. *D. C. Fl. fr. n.* 2290. *Illecebrum paronychia*. *Sp. pl.* 299. *Sibth. n.* 566. — In collibus siccis Melitæ et Meli frequens. ♃

225. VINCA *pubescens*. Undiquè pubescens, pedicellis hirtis, foliis ovatis obtusis mollibus, floribus breviùs pedunculatis, segmentis calycinis filiformibus ciliatis.

Affinis V. *majori* et *minori*, huic accedit formâ calycis; ab utrâque differt foliis et pedunculis hirtis foliisque minoribus. — In Colchide frequens, ad sepes. Junio floret. ♄

226. NERIUM *oleander*. *Sp. pl.* 305. *Sibth. n.* 570. —In cunctis ferè insulis Archipelagi, nusquàm ad littora Ponti-Euxini vidi. ♄

227. PERIPLOCA *Græca*. *Sp. pl.* 309. *Sibth. n.* 571. *Marsch. Fl. taur. n.* 441. —Vulgata in Colchide, suprà sepes scandens. ♄

228. CYNANCHUM *erectum*. *Sp. pl.* 311. *Sibth. n.* 574.—Apocynum folio subrotundo ex viridi et flavescente variegato. *Gundelsheimer in Herb. Tourn.* — Circà Neria volubilis, in insulâ Scyro copiosissimè julio floret. ♃

229. C. *Monspeliacum*. *Sp. pl.* 311. *Sibth. n.* 573. —Scammonea Monspeliaca, foliis rotundioribus. *Herb. Tourn.* — Ad sepes vulgare, in insulis Lesbo, Samo, etc. in lazaret Odessæ. ♃

230. C. *acutum*. *Sp. pl.* 310. *Sibth. n.* 572. — Scammoneæ Monspeliacæ affinis foliis acutioribus. *Herb. Tourn.* —Nonnè præcedentis mera varietas?—In insulâ Melo commune. ♃

231. CHIRONIA *centaurium*. *Sibth. n.* 543. *Gentiana centaurium*. *Sp. pl.* 332.—Variat interdùm flore purpureo et flore prorsùs albo. — In collibus Sami haud rara reperitur. ☉

II. DIGYNIA.

232. CRESSA *Cretica*. *Sp. pl.* 325. *Sibth. n.* 598. —Quamoclit minima humifusa palustris, herniariæ folio.

Tourn. Cor. 4. *Herb. Tourn.*—In arenis Sami, in Macedoniâ propè canalem Xerxis non rara. ☉

233. CUSCUTA *epithymum. Syst. veg. p.* 140. *Sibth. n.* 602. — In diversis plantis parasitica, tùm in Anagyri fœtidâ. ♄

234. VELEZIA *clavata.* V. *quadridentata*? *Sibth. n.* 954. V. caule patulo glabro stricto parcè ramoso, ramis paucifloris, foliis brevibus linearibus, pedunculis incrassatis, calycibus glaberrimis clavatis quadrangulis, floribus minimis amœnè rubellis.— In arvis maritimis insulæ Astypalææ. Maio floret. ☉

235. V. *rigida Sp. pl.* 474. *Sibth. n.* 953.— In arvis nemorosis Bulgariæ. ☉

236. HERNIARIA *hirsuta. Sp. pl.* 317. *Sibth. n.* 578. —In herbidis Odessæ. ♄

237. H. *cinerea. D. C. Fl. fr. n.* 2293 (*a*).—Ad margines viarum insulæ Melitæ. ☉

238. ATRIPLEX *halimus. Sp. pl.* 1492. *Sibth. n.* 2329. — Frequens in insulâ Melo, in littoribus Atticis. ♄

239. A. *recurva.*

A. maritima laciniata. C. B. *Tourn. Inst.* 505. *Icon. Aubriet.* Optimè.

A. caule patulo ramoso, foliis longiùs petiolatis, utrinque argenteis laciniatis apice recurvis crassis ferè carnosis, spicis nudis terminalibus.

Planta tota pulvere denso incano obsita, folia ramorum sterilium multò magis recurva quàm in ramis fructiferis. Fructus non vidi.—Ad littus Atticum, propè insulam Helenam legi. Ineunte octobri floret. ♄

240. BETA *maritima. Sp. pl.* 322. *Sibth. n.* 590. —Ad littora salsa insulæ Melitæ. Aprili. ♃

241. SALSOLA *soda. Sp. pl.* 323.—Ad littus Pyræi, propè Athenas. ☉

242. S. *prostrata. Sp. pl.* 323. *Marsch. Fl. taur. n.* 472.—Chenopodium Armenium, fruticosum, incanum, psyllii folio. *Gundelsheimer in Herb. Tourn.*— In maritimis Tauriæ, circà Sevastopolem haud rara. Junio floret. ♄

243. S. *brevi-folia. Desf. atl.* 1. *p.* 218. — In rupibus maritimis insulæ Meli, circà tumulos et theatrum copiosissimè. Septembri florens. ♄

244. ERYNGIUM *Creticum. Lam. Ency.* 4. *p.* 754. E. *multifidum. Sibth. n.* 611.

E. creticum, erectum, folio multifido, caule et ramis amethystinis. *Herb. Tourn.* — In arvis Sami nimiùm frequens. Junio floret. ♃

245. E. *glomeratum. Lam. Ency.* 4. *p.* 755. E. *parvi-florum. Sibth. n.* 612.

E. foliis laciniatis, capitulis florum exiguis et densè congestis. *Tourn. Cor.* 23. *Icon. Aubriet.* Optimè.— Frequens in summis montibus insulæ Coi, ad altitudinem 400 hexapodum. Maii fine flores non conspicui. ♃

246. ECHINOPHORA *tenui-folia. Sp. pl.* 344. *Sibth. n.* 627.– In vineis insulæ Tenedi ubique reperitur. Julio floret. ♃

247. BUPLEVRUM *rotundifolium. Sp. pl.* 340. *Sibth. n.* 615.—In collibus Theodosiæ vulgaris. ☉

Var. *B. intermedium. Loisel. not.* 45. Insignis caule

ramoso patulo, supernè flavicante, umbellis bifidis vel trifidis tantùm, quandòque bracteâ ovatâ instructis, involucellis ovatis latis floribus saltèm duplò longioribus. — In segetibus insularum Melitæ et Meli copiosè crescit. ⊙

248. B. *semi-compositum*. *Sp. pl.* 342. *Sibth. n.* 619.—In insulâ Melo; aprili floret. ⊙

249. B. *glaucum*. *D. C. Fl. fr. n.* 3543 (a).—Præcedentis, ut credo, mera varietas.—In scopulo St-Istad, propè Cimolum. Aprili. ⊙

250. B. *gracile*. Caule ramoso dichotomo gracili, foliis angustissimis ferè setaceis, involucro triphyllo, pedi culis inæqualibus, involucellis scariosis subdiaphanis lanceolatis trinerviis fructibus duplò longioribus.

Planta gracilis vix 3-4 uncialis erecta, multoties dichotoma; involucellis ferè diaphanis lanceolatis longè acuminatis.

B. annuum minimum, angustifolium. *Herb. Tourn.* —In sterilibus Astypalææ vulgaris. Maio florens. ○

251. B. *junceum*. *Sp. pl.* 343. *Sibth. n.* 623.—In nemoribus Bulgariæ, propè pagum Ineada. ⊙

252. B. *odontites*. *Sp. pl.* 342. *Sibth. n.* 616.—Propè Smyrnam, in arvis maritimis. ⊙

253. CAUCALIS *maritima*. *D. C. Fl. fr. n.* 3507. *Daucus maritimus*. *Gærtn. fr.* 1. *p.* 80. *Caucalis pumila*. *Wild. Sp.* 1. *p.* 1385. *Sibth. n.* 637.—In arenis maritimis insulæ Meli. Aprili floret. ⊙

254. C. *daucoïdes*. *Sp. pl.* 546. *Sibth. n.* 655.—Circà Trapezum, in arvis.

255. C. *scandicina*. *D. C. Fl. fr. n.* 3513. *Scandix anthriscus*. *Sp. pl.* 368. *Sibth. n.* 688. *Anthriscus*

caucalis. Marsch. Fl. taur. n. 574. — In Tauriâ circà Theodosiam frequens. ⊙

256. C. *arvensis. D. C. Fl. fr. n.* 3510. C. *aspera. b. Lam. Ency.* 1. *p.* 656.—Propè Byzantium, ad sepes. ⊙

257. DAUCUS *hispidus. Desf. atl.* 1. *p.* 243.—Ad littora maritima insulæ Sami. ♃

258. D. *muricatus. Sp. pl.* 349.—In maritimis Archipelagi. Julio. ⊙

259. AMMI *visnaga. Desf. atl.* 1. *p.* 245. *Sibth. n.* 650. *Daucus visnaga. Sp. pl.* 348.—Valdè frequens in insulâ Samo, in sinu Smyrnæo, in peninsulâ Athonis etc. Julio floret, ⊙

260. BUNIUM *Creticum.* Caule dichotomo ferè nudo; foliis glabris, caulinis in laciniis linearibus dissectis, radicalium foliolis ovatis incisisque, radice tuberosâ. Bulbocastanum creticum, radice napiformi. *Herb. Vaillant. Herb. Tour.*—In insulâ Coo, ad sepes. Maio floret. ♃

261. BUNIUM *ferulæ-folium. Desf. Ann. Mus. t.* 11. *tab.* 30. B. *ferulaceum. Sibth. n.* 651.—Bulbocastanum Creticum, ferulæ-folio, semine oblongo. *Tourn. Cor.* 21. *Herb. Tourn.*—In insulâ Samo, in arvis hyeme submersis. Medio junio jàm floruerat. ♃

262. CICUTA *major. Tourn. Inst.* 306. *D. C. Fl. fr. n.* 3494. *Conium maculatum. Sp. pl.* 349. *Sibth. n.* 653.—In ruderatis circà Trapezum frequens. ♂

263. CACHRYS *Sicula. Sp. pl.* 355. *Sibth. n.* 661. —Copiosè in agris Sami, propè ruinas veteris urbis. Maio floret. ♃

264. THAPSIA *Garganica. Mant.* 57. *Sibth. n.* 703.

Gouan. Illust. 18. *tab.* 10. Frequentissima in insulis Melo, Cimolo, et Astypalæâ etc. Maio floret. ♃

265. T. *prœalta.* Foliis radicalibus amplis lucidis quadrifariam decompositis, foliolis oblongis incisis ferè pinnatifidis, caule 6-8 pedali supernè ramoso, umbellis numerosis, centrali multò breviore; lateralium pedunculis basi binâ bracteâ lanceolatâ instructis.

Fructus non vidi maturos. – In rupibus præruptis insulæ Coi, ad altitudinem 300 hexapodum. Floret finiente maio. ♃

266. FERULA *meoïdes. Sp. pl.* 356. — Laserpitium orientale, folio mei, flore luteo. *Tourn. Cor.* 23. *Herb. Tourn. Vaillant.*

267. TORDYLIUM *humile. Desf. atl.* 1. *p.* 235. Frequens in apricis Melitæ atque Meli. Aprili. ☉

268. T. *apulum. Sp. pl.* 345. *Sibth. n.* 631. — In collibus Meli cum præcedente reperitur. ☉

269. T. *officinale. Sp. pl.* 345. *Sibth. n.* 630. — In campis Asiæ minoris, propè Byzantium

270. SIUM *Siculum. Sp. pl.* 362. — Daucus pastinacæfolio siculus. *Zan. hist.* 78. *t.* 30. Myrrhis sicula foliis pastinacæ lætè virentibus. *Tourn. Cor.* 22. *Herb. Tourn.* — In collibus Meli sæpiùs acaule aprili floret. ♃

271. S. *falcaria. Sp. pl.* 362. *Sibth. n.* 276. *Bunium falcaria. Marsch. Fl. taur. n.* 530. — In insulâ Berezen ad Borysthenem copiosisimè. ♃

272. CUMINUM *minutum.* Caule gracili ramoso, foliis decompositis, laciniis linearibus obtusis, involucellis setaceis fructibus subæqualibus, fructibus parvis oblongis.

A C. cymino differt caulibus minoribus vix 2-3 uncialibus, foliolis et involucellis fructibusque triplò minoribus, præsertim his longè et inæqualitèr pedicu-

latis. —frequens in cacumine umbroso insulæ Coi, ad altitudinem 450 hexapodum. Maio floret. ⊙

273. ŒNANTHE *pimpinelloïdes*. *Sp. pl.* 366. *Sibth. n.* 680. — In Colchidis paludosis, circà Soukoum.

274. SCANDIX *australis*. *Sp. pl.* 369. *Sibth. n.* 687. —In arvis insulæ Coi nascitur. ⊙

275. SESELI *tortuosum*. *Sp. pl.* 273. *Sibth. n.* 697. —In lazaret Odessæ, in arenosis Macedoniæ ad Canalem Xerxis. Julio floret. ♃

276. PASTINACA *opopanax*. *Sp. pl.* 376. *Sibth. n.* 705.—In insulâ Samo parcè reperitur. Julio floret. ♃

277. P. *sativa*. *Sp. pl.* 376. *Sibth. n.* 704. *Marsch. Fl. taur. n.* 589. — In lazaret Odessæ, julio floret. ♂

278. SMYRNIUM *ramosum*. Caule glabro tereti ramosissimo, foliis infernis amplè vaginatis decompositis, foliolis ovatis crenatis, foliis supernis simplicibus, umbellis confertis numerosissimis, fructibus minimis.

A S. *perfoliato* facilè dignoscitur caulibus basi supernèque ramosis teretibus nullatenùs alatis, umbellis majoribus et magis ramosis, imprimis ramis et bracteis supernè frequentèr oppositis. —Copiosissimè crescit in summo culmine insulæ Coi. Maio florens. ♃

279. ANETHUM *segetum*. *L. Mant.* 219. *Sibth. n.* 709. Anethum segetum viride. *Herb. Tour.* — In agris et hortis insulæ Sami, circà Byzantium etiam legi. ⊙

280. PIMPINELLA *nodosa*. Caule ramoso dichotomo glaberrimo, foliis multipartitis, laciniis linearibus, umbellis numerosis, fructibus minimis ovatis pilis raris adspersis.

In loco involucri caulis sæpiùs in nodum crassum et turbinatum auctus.—Frequens in saxosis Sami, ad ruinas veteris urbis. Floret junio. ♃

281. P. *hispida Loisel. Not.* 48. *D. C. Fl. fr. n.* 3414 (*b*). Frequentèr occurrit ad sepes insulæ Scyri. ♂

282. P. *dioïca. L. Mant.* 357. *Sibth. n.* 712. *Marsch. Fl. taur. n.* 602.—Communis in pascuis Tauriæ, propè Kerch. ♃

283. CHÆROPHYLLUM *aromaticum. Sp. pl.* 371. *Sibth. n.* 671. — Circà Byzantium, in sepibus. Julio floret. ♃

III. TRIGYNIA.

284. RHUS *cotinus. Sp. pl.* 383. *Sibth. n.* 717. *Marsch. Fl. taur. n.* 607. — Frequens in nemoribus insulæ Thasi atque propè montem Athônem. Julio floret. ♄

285. STAPHYLEA *pinnata. Sp. pl.* 386. *Sibth. n.* 723. *Marsch. Fl. taur. n.* 613. — In sylvis Colchidis copiosa : propè Soukoum. ♄

286. TAMARIX *Africana. Desf. Fl. atl.* 1. *p.* 269. —Ad ripas fluviorum copiosa, circà Trapezum. ♄

287. T. *Germanica. Wild. Sp.* 1. *p.* 1499. *Marsch, Fl. taur. n.* 616. — In torrentibus circà Trapezum : junio floret. ♄

288. PHARNACIUM *cerviana. Sp. pl.* 388.—In arenosis insulæ Scyri haud rarum. Floret junio. ☉

IV. PENTAGYNIA.

289. STATICE *Gmelini. Wild. Sp.* 1. *p.* 1524. *Marsch. Fl. taur. n.* 622.—In Bulgariâ, ad littora Ponti-Euxini. Floret junio. ♃

290. S. *scoparia. Wild. Sp.* 1. *p.* 1424. *Marsch.*

Fl. taur. n. 621. — Circà Odessam frequens occurrit. Julio florens. ♃

291. S. *ocymi-folia. Poiret. Ency. sup.* 5. *p.* 238. S. *spathulata. Wild. Hort. Kew. non Desf.* — Limonium græcum, minus, ocymi-folio. *Herb. Tourn.* — In scopulo Raphthi, ad littus Atticum, copiosissimè ♃

292. S. *prolifera.* Caule suffruticoso ramoso reticulato, foliis oblongis spathulatis rugosis fasciculatim dispositis in dichotomiâ ramorum, racemis strictis erectis, floribus remotis.

Limonium fruticosum, bellidis folio, proliferum, insularum Cycladum. *Herb. Tourn. Icon. Aubriet.* — Propè Theram frequens in novis insulis Ferasiâ et Camini. Maio floret. ♄

293. S. *bellidi-folia. Sibth. n.* 733. *D. C. Fl. fr. n.* 2323. — Limonium, bellidis folio, in insulâ Melo. *Herb. Tour.* — Ad littora maris, in insulâ Melo, in Argolide propè Lernæ paludem. Æstate floret. ♃

294. S. *dichotoma. Sibth. n.* 736?

S. scapo ramosissimo paniculato; ramis punctato-scabris: inferioribus sterilibus, foliis obovatis brevioribus.

Limonium maritimum, minus oleæfolio. *Herb. Tourn.* — In littoribus Meli copiosissimè. Floret septembri. ♃

295. S. *incana. Vahl. Symb.* 1. *p.* 25. *Marsch. Fl. taur. n.* 625. — In plantâ nostrâ folia glauca sed nequaquàm incana. — Ad littora Ponti-Euxini in Bulgariâ frequens. Floret julio. ♃

296. S. *tatarica. Sp. pl.* 395. *Marsch. Fl. taur. n.* 624.

Var. *angustifolia.* — In lazaret Sevastopoles et Odessæ copiosè floret julio. ♂

297. S. *sinuata*. *Sp. pl.* 396. *Sibth. n.* 741. — In insulis Melo, Astypalæâ, Coo, Samo, Lesbo, etc. Floret maio. ♃

298. S. *globulariæ-folia*. *Desf. atl.* 1. *p.* 274. *Sibth. n.* 734.—A plantâ *Cl. Desf.* nostra differre videtur foliis obtusis et angustioribus, caulibus altioribus magis strictis et dichotomis, ramis denique patentibus.—In arenosis insulæ Leri parùm frequens. Floret maio. ♃

299. LINUM *Austriacum*. *Sp. pl.* 399. *Marsch. Fl. taur. n.* 633.—In Tauriæ pascuis valdè vulgare, propè oppidum Kerch. ♂

300. L. *angusti-folium*. *Fl. Br.* 344. *Sibth. n.* 745. In insulâ Melo. ♃

301. CRASSULA *rubens*. *Sibth. n.* 753. *Sedum rubens*. *Sp. pl.* 619. — In saxosis insulæ Meli. Floret maio. ☉

VI. HEXANDRIA.

I. MONOGYNIA.

302. NARCISSUS *serotinus*. *Desf. atl.* 1. *p.* 283. N. albus autumnalis minimus Clusii. *Inst.* 355. *Icon. Aubriet.* Rarissimè spatham bifloram vidi, sæpiùs unifloram. — In ericetis insulæ Meli frequens. Octobri floret. ♃

303. PANCRATIUM *maritimum*. *Sp. pl.* 418. *Sibth. n.* 760.—Ad littora arenosa, in insulâ Lemno frequens, frequentiùs in peninsulâ Athonis. Julio, augusto.

304. AMARYLLIS *lutea*. *Sp. pl.* 420. *Sibth. n.* 761. Ad littus Phioticum, etiàm circà Athenas reperitur in colle Musæo. ♃

305. ALLIUM *subhirsutum*. *Sp. pl.* 424. *Sibth.*

n. 767. *Desf. Fl. atl.* 1. *p.* — In insulis Melitâ et Melo haud rarum. Aprili. ♃

306. A. *Græcum.* Foliis planis hirsutis cauli subæqualibus, umbellâ capsuliferâ fastigiatâ, spathâ unifoliâ amplâ ovatâ, pedicellis filiformibus, petalis longis acuminatis.

Simillimum præcedenti, differt tamen spathâ ampliori, pedicellis multò gracilioribus, petalis acutis et floribus sæpiùs roseis. — In insulâ Melo frequens. Aprili floret. ♃

307. A. *nigrum. Sp. pl.* 430. *Sibth. n.* 779. — In arvis Insulæ Melitæ rariùs. Aprili floret. ♃

308. A. *album. Lois. not.* 56. *D. C. Fl. fr. sup. n.* 1956 (*a*). A. *lacteum*? *Sibth. n.* 781. — In torrentibus insulæ Astypalææ. Aprili floret. ♃

309. A. *ursinum. Sp. pl.* 431. *Marsch. Fl. taur. n.* 659. — In sylvis Colchidis copiosè nascitur. Maio. ♃

310. A. *sphærocephalon. Sp. pl.* 426. *D. C. Fl. fr. n.* 1975. — In arenosis Colchidis, in pascuis Odessæ. Junio, julio. ♃

311. A. *moschatum. Sp. pl.* 427. *D. C. Fl. fr. n.* 1969. — Frequens in collibus apricis insulæ Astypalææ. Maio floret. ♃

312. A. *pilosum. Sibth. n.* 777?

A. caule tereti humili umbellifero, foliis subteretibus longissimis villosis, spathâ bicorni umbellæ subæquali, segmentis obtusis, staminibus simplicibus.

Planta vix 5-4 uncialis, foliis patulis longissimis, caule flexuoso, spathâ mediocri, floribus intensè purpureis in umbellâ inæquali dispositis, staminibus corollâ vix longioribus. — In apricis insulæ Astypalææ non infrequens. Maio floret. ♃

313. A. *guttatum. Steven. in Herb. Musæi.*

A. caule folioso umbellifero, foliis semi-teretibus tenuibus, vaginis longis, pediculis exterioribus brevioribus, staminibus corollâ longioribus, alternis tricuspidatis, floribus minimis densè congestis pallidis, segmentis linearibus acutis dorso amænè rubro-guttatis.

Haud rarum occurrit in collibus Scyri, in pascuis Odessæ; julio florens. ♃

314. A. *flexuosum.* A. *statici-forme* ? *Sibth. n.* 776.

A. caule semper flexuoso folioso rigido glaberrimo, foliis infernis semi-teretibus, supernis, ad vaginam transversim truncatam reductis, spathâ bicorni umbellæ subæquali, umbellâ capsuliferâ rotundatâ, segmentis purpureis obtusis, staminibus simplicibus corollâ vix longioribus, germine tricocco.

In arenosis insularum Astypalææ et Leri copiosè crescit. Maio florens. ♃

315. A. *paniculatum. Sp. pl.* 428. *Sibth. n.* 774. *Marsch. Fl. taur. n.* 653.—In lazaret Odessæ copiosissimè julio floret. ♃

316. A. *flavum. Sp. pl.* 428. *Sibth. n.* 772. *Marsch. Fl. taur. n.* 652.—In collibus siccis insulæ Leri, in lazaret Odessæ floret julio. ♃

317. FRITILLARIA *Pyrenaïca. Sp. pl. ed.* 1. *p.* 304. *Sibth. n.* 788.

F. flore minore. *Tourn. Inst.* 377. *Herb. Vaillant.* — In nemoribus circà Byzantium copiosa. Aprili floret. ♃

318. ORNITHOGALUM *Pyrenaïcum. D. C. Fl. fr. n.* 1945. *Sibth. n.* 796.—Vulgare in rupibus colsis insularum Coi et Astypalææ. Maio florens. ♃

319. O. *Arabicum. Sp. pl.* 441. *D.C. Fl. fr. n.* 1947. —In saxosis insulæ Melitæ : aprili floret. ♃

320. SCILLA *maritima. Sp. pl.* 442. *Sibth. n.* 797. — In insulis Archipelagi, in campis Argolicis nimiùm frequens. Septembri floret. ♃

321. ASPHODELUS *ramosus. Sp. pl.* 444. *Sibth. n.* 803.—In insulâ Melo haud rarè. Aprili. ♃

322. A. *fistulosus. Sp. pl.* 444. *Sibth. n.* 804. — In collibus insulæ Leri rariùs occurrit. Junio. ♃

323. ANTHERICUM *Græcum. Sp. pl.* 444. *Sibth. n.* 805. — Bulbocodium myosotidis flore. *Ins. Cycl. Herb. Tourn.* — In montibus celsioribus insulæ Coi ad altitudinem 400 hexapodum, deindè in planitie insulæ Meli copiosissimè reperi. Aprili floret. ♃

324. ASPARAGUS *officinalis. Sp. pl.* 448. *Marsch. Fl. taur. n.* 691.—In arenosis Colchidis, propè arcem Soukoum-Kale. Junio florens. ♃

325. A. *verticillatus. Sp. pl.* 450. *Sibth. n.* 811. *Marsch. Fl. taur. n.* 692. *Buxb. C.* 5. *app. n.* 47. *t.* 37.

A. Ibericus, foliis galii. *Tourn. Cor.* 21. *Herb. Tourn.* —In collibus Tauriæ, circà Sevastopolem. ♃

326. A. *aphyllus. Sp. pl.* 450. *Sibth. n.* 809.

A. Creticus, fruticosus, crassioribus aculeis, magno fructu. *Herb. Tourn.* — In insulâ novâ Camini propè Theram jàm copiosè crescit ad latera veteris vulcani. Maio. ♃

327. HYACINTHUS *ciliatus. Marsch. Fl. taur. n.* 699. — In herbidis Tauriæ, propè Kerch copiosè. Maio floret. ♃

328. JUNCUS *rigidus. Desf. Atl.* 1 *p.* 312.—Cap-

sula ovata obtusa fusca perigono subæqualis. Frequens in paludosis insulæ Sami. ♃

329. J. *multiflorus. Desf. Atl.* 1 *p.* 318.—In maritimis insulæ Scyri copiosissimè. Julio. ♃

330. J. *pygmæus. Thuil. Fl. par.* 1. *p.* 178. *D. C. Fl. fr. n.* 1845.—Ad torrentes insulæ Meli. Aprili floret. ⊙

331. J. *bufonius. Sp. pl.* 466. *Sibth. n.* 829. *Marsch. Fl. taur. n.* 704. — In udis Colchidis haud rarè propè Soukoum reperitur. Floret junio. ⊙

332. LUZULA *vernalis. D. C. Fl. fr. n.* 1825. *Juncus pilosus. Sp. pl.* 468. *Sibth. n.* 830. *Marsch. Fl. taur. n.* 705.—In sepibus Colchidis : maio floret. ♃

333. L. *campestris. D. C. Fl. fr. n.* 1827. *Juncus campestris. Sp. pl.* 468. *Sibth. n.* 831.—Circà Byzantium, in nemoribus copiosè maio floret. ♃

334. LEONTICE *leontopetalum. Sp. pl.* 448. *Sibth. n.* 807. — In arvis Astypalææ ineunte maio jàm floruerat. ♃

335. BERBERIS *vulgaris. Sp. pl.* 472. *Sibth. n.* 832. *Marsch. Fl. taur. n.* 707.—In sylvis Colchidis vulgatissima. ♄

336. FRANKENIA *lævis. Sp. pl.* 473. *Sibth. n.* 835. Alsine maritima supina, vermiculato folio. *Herb. Tourn.* —In maritimis insulæ Astypalææ. Maio floret. ♃

337. F. *pulverulenta. Sp. pl.* 474. *Sibth. n.* 837. Ad margines viarum communis, in insulâ Melitâ. Floret aprili. ⊙

338. F. *hirsuta. Sp. pl.* 473. *Sibth. n.* 836. Alsine Cretica maritima, supina, caule hirsuto, foliis quasi vermiculatis. *Herb. Tourn.*

F. caule suffruticoso hispido ramosissimo suberecto, foliis linearibus fasciculatis, floribus densè confertis in summitate ramorum.

Affinis præcedenti à quâ tamen facilè distinguitur, caule suffruticoso, floribus majoribus per caulem nunquàm sparsis, semper in extremis ramis densè congestis, tandem calycibus nullomodo pilis albidis tectis. — Ad littus Atticum in scopulo Raphthi copiosissimè crescit. ♄

II. TRIGYNIA.

339. RUMEX *scutatus. Sp. pl.* 480. *D. C. Fl. fr. n.* 2234. — In saxosis insulæ Meli; propè Monasterium. ♆

340. R. *spinosus.. Sp. pl.* 481. *Sibth. n.* 851. — In arvis insulæ Meli copiosissimè aprili floret. ☉

341. R. *nemolapathum. Linn. Sup.* 212. *Marsch. Fl. taur. n.* 713.—Ad rivulos et fossas Colchidis haud rarus. ♄

342. COLCHICUM *montanum. Sp. pl.* 485. *Sibth. n.* 859.

C. montanum, angusti-folium. *C. B. Inst.* 350. *Icon. Aubriet.*—In ericetis Insulæ Meli vulgatissimum. Octobri floret. ♄

343. C. *variegatum. Sp. pl.* 485. *Sibth. n.* 861.

C. flore fritillariæ instàr tessulato. *C. B. Icon. Aubriet.*—In montibu insulæ Scopeli vulgare, ad altitudinem 3-400. hexapodum; septembri floret. ♄

VII. HEPTANDRIA.

I. MONOGYNIA.

344. ÆSCULUS *hippocastanum. Sp. pl.* 488. *Sibth. n.* 863. — Circà Byzantium cultum. ♄

VIII. OCTANDRIA.

1. MONOGYNIA.

345. VACCINIUM *arcto-staphylos*. *Sp. pl.* 500. *Marsch. Fl. taur. n.* 735. — Vitis idæa Cappadocica maxima, mespilifolio, flore variegato. *Tourn. Cor.* 42. *Herb. Juss.* — Circà Trapezum, in nemoribus crescit cum Azaleâ Ponticâ et Rhododendro Pontico. Junio ineunte floret. ♄

346. ACER *Creticum*. *Sp. pl.* 1497. *Sibth. n.* 897. A. Cretica. *Cor.* 43. *Icon. Aubriet.* — In montibus insulæ Scyri arbos vulgaris. ♄

347. ERICA *multiflora*. *Sp. pl.* 503. *Sibth. n.* 876. — Erica foliis corios, multiflora. *Tour. I.* 602. *Herb. Vaillant.*

348. E. *Mediterranea*. *Wild. Sp. pl.* 2. *p.* 410. ? E. orientalis, coris folio, floribus globosis. *Tourn. Cor.* 42. *Herb. Vaillant.* — In apricis Sami, ad urbem Vathi communis. Junio florens. ♄

349. E. *arborea*. *Sp. pl.* 502. *Sibth. n.* 875. — In collibus circà Byzantium haud rara. ♄

350. DAPHNE *tarton-raira*. *Sp. pl.* 510. *Sibth. n.* 882.

Var. Angusti-folia. Foliis angustis et sericeis caulibusque elatis ad *D. argenteam*. *Sibth.* accedit. Exactè media inter utramque speciem. — Thymelæa foliis candicantibus, serici instàr mollibus, angustioribus. Ins. M. Ægei. *Herb. Tourn.* — In cacumine Insulæ Scopeli, ad altitudinem 400 hexapodum crescit. ♄

351. D. *Pontica*. *Sp. pl.* 511. *Sibth. n.* 885. Thymelæa Pontica, citrei foliis. *Tourn. Cor.* 41. *Herb.*

Tourn. — Circà Byzantium frequens, in nemoribus. Maio floret. ♄

352. D. *oleoïdes. Mant.* 66. *Sibth. n.* 888. Thymelæa Cretica, oleæfolio utrinque glabro. *Tourn. Cor.* 41. *Herb. Tourn.* Parcè crescit ad ruinas veteris Sami. Junio florens. ♄

353. D. *collina. Wild. Sp.* 2. *p.* 423. *Sibth. n.* 892. D. *oleæfolia. Lamarck. Ency.* 3. *p.* 440. — Folia subtùs vix pubescentia. — In summo cacumine montis Athonis crescit, ad altitudinem 1100 hexapodum. Augusto florens. ♄

354 POLYGONUM *aviculare. Sp. pl.* 519. *Sibth. n.* 908. — In aridis insulæ Tenedi copiosè. ☉

IX. ENNEANDRIA.

I. MONOGYNIA.

355. LAURUS *nobilis. Sp. pl.* 529. *Sibth. n.* 912. — In cunctis insulis Archipelagi ubique reperitur. ♄

X. DECANDRIA.

I. MONOGYNIA.

356. ANAGYRIS *fœtida. Sp. pl.* 534. *Sibth. n.* 915. — Frequens ad torrentes insulæ Astypalææ. ♄

357. CERCIS *siliquastrum. Sp. pl.* 534. *Sibth. n.* 916. — In insulis Coo et Samo haud rarè occurrit. ♄

358. ZYGOPHYLLUM *fabago. Sp. pl.* 551. *Marsch. Fl. taur. n.* 767. — Ad littora maris abundat, circà Theodosiam et Sevastopolem. Junio floret. ♃

359. DICTAMNUS *albus. Sp. pl.* 548. *Sibth. n.* 917.

Marsch. Fl. Taur. n. 763. — Copiosissimè crescit in collibus graminosis : circà Trapezum. ♃

360. RUTA *graveolens. Sp. pl.* 548. *Sibth. n.* 918. *Marsch. Fl. taur. n.* 764. — In Tauriâ circà ruinas veteris Chersonesi copiosa. Floret junio. ♃

361. R. *chalepensis.* L. *Mant.* 69. *Sibth. n.* 920. Circà Trapezum haud rara. ♃

Var. a. tenui-folia. Caule minori, foliolis glaucis et tenuioribus notanda. Media videtur inter R. *chalepensem. L.* et *R. angustifoliam. Persoon.* — Hæc abundat in scopulo St.-Istad propè Cimolum. Floret maio. ♃

362. RHODODENDRUM *Ponticum. Sp. pl.* 562. — In nemoribus circà Trapezum abundat. Maio florens. ♄

363. ARBUTUS *unedo. Sp. pl.* 566. *Sibth. n.* 925. — In nemoribus insulæ Scopeli. ♄

364. A. *andrachne. Sp. pl.* 566. *Sibth. n.* 926. — In sylvis insularum Coi, Sami, Scopeli, etc. Copiosè crescit. ♄

II. DIGYNIA.

365. SAXIFRAGA *Orientalis. Wild. Sp.* 2. *p.* 658. S. *hederacea*? *Marsch. Fl. taur. n.* 785. S. *cymbalaria*? *Sibth. n.* 936. — Geum cappadocicum rotundifolium supinum, flore aureo. *Herb. Tourn. Icon. Aubriet.* — Circà Trapezum, tegens rupem ferè nudam ampliùs ducenta pedes longam vigintique pedes latam, ad ripas fluvii Pyxitis. Junio floret. ♃

366. SCLERANTHUS *perennis. Sp. pl.* 580. — Circà Byzantium, in monte Bougourlou. Maio. ♆

367. GYPSOPHYLE *perfoliata. Sp. pl.* 583. *Marsch. Fl. taur. n.* 792. — Lychnis orientalis, saponariæ folio et facie, flore parvo et multiplici. *Herb. Tourn.* — In lazaret Odessæ haud rarè. Julio floret. ♃

368. G. *compressa. Desf. Fl. atl.* 1. *p.* 343. Frequens in summis montibus insulæ Scopeli, ad altitudinem 400 hexapodum. ♃

369. G. *saxifraga. Sp. pl.* 584. *Marsch. Fl. taur. n.* 796.—In aridis circà Trapezum abundat. Junio. ♃

370. DIANTHUS *pomeridianus. Smith. Act. Soc. Linn.* 2. *p.* 300. *Marsch. Fl. taur. n.* 814.

D. floribus solitariis, caule debili procumbente, squamis calycinis ovatis acutis tubo triplò brevioribus, tubo apice striato, petalis brevibus emarginatis.

Caryophyllus sylvestris et saxatilis flore magno lacteo, subtùs ad spadiceum colorem vergente. *Cor.* 23. *Herb. Tourn. Herb. Juss.*—Flores intùs lividi, extùs viridi-rubentes. In insulâ Astypalæâ. Maio copiosissimè floret. ♃

371. DIANTHUS *atro-rubens. Wild. Sp.* 2. *p.* 672. *Marsch. Fl. taur. n.* 802.— Frequens in collibus apricis circà Sevastopolem. ♃

372. D. *prolifer. Sibth. n.* 958. *Marsch. Fl. taur. n.* 804. D. *diminutus. Sp. pl.* 587.—Vulgaris in insulis Græciæ, necnon in Tauriâ. ☉

373. DIANTHUS *giganteus.* Caule basi ramoso suffruticoso, foliis longis linearibus, floribus in capitulis densis congestis basi suffultis bracteis foliaceis, squamis calycinis quaternis acutis tubo duplò brevioribus.

Pulchra species. Ex radice crassâ tortuosâ plurimi exurgunt caules crassitudine pennæ anserinæ 4-3 pedes alti;

folia glabra lætè viridia 2 lin. lata, 4-6 uncias longa, basi coalita in vaginam longam, flores intensè purpurei saltem quindecim in capitulo denso congesti, calyces rubentes ferè unciales, petala brevia crenata. — Ad littora Bulgariæ, in rupibus maritimis. Floret junio. ♃

374. D. *moschatus. Poiret. Ency.* 4 *p.* 521.

Cæspitibus densis crescit in rupibus præruptis insulæ Coi, ad altitudinem 3-400 hexapodum. Maio floret. ♃

375. D. *elegans.* D. *crinitus? Sibth. n.* 967.

D. floribus solitariis, caule erecto filiformi pauciflori-ro, foliis angustis internodiis subæqualibus, squamis calycinis brevibus ovatis scariosis mucronatis, petalis dentatis.

Flos amœnè albo et purpureo variegatus. In insulâ Coo ubique frequens. Maio floret. ♃

376. D. *divaricatus.* D. *tripunctatus? Sibth. n.* 963.

D. Syriacus ramosissimus, flore pallidè carneo. *Sherard in Herb. Vaillant.*

D. floribus solitariis, caule patulo ramoso divaricato, ramis strictis unifloris, foliis brevibus subulatis, squamis calycinis quaternis scariosis subulatis, calycibus apice sensim attenuatis ferè conicis, petalis serratis.

Flores pallidè purpurei intùs nigro-punctati. — In collibus aridis insulæ Sami. Junio florens. ♂

377. D. *pallens. Sibth. n.* 965.

D. floribus solitariis, caule procumbente ramoso, squamis ovatis acuminatis tubo duplò brevioribus, foliis brevibus laxis acutis, floribus laciniatis.

A præcedente differt ramis non strictis, floribus magis approximatis, calycibus apice vix coarctatis, petalisque

majoribus et tenuiùs laciniatis.—In montibus insulæ Coi, in collibus circà Thessalonicam. Junio floret. ♃

378. D. *armeria. Sp. pl.* 586. *Sibth. n.* 959. *Marsch. Fl. taur. n.* 801.—In collibus circà Sevastopolem; in Bulgariâ ad pagum Ineada copiosè. ♃

379. D. *pubescens. Sibth. n.* 962.

D. pubescens, floribus subsolitariis, squamis sulcatis mucronatis tubo duplò brevioribus, calyce sulcato mucronato, foliis brevibus laxis striatis.

Planta tota viscida-pubescens, flores parvi, pallidi.—In collibus apricis insulæ Tenedi, haud rara. Julio floret. ♃

380. D. *campestris. Marsch. Fl. taur. n.* 808. In herbidis Odessæ. Julio florens. ♃

381. D. *bicolor. Marsch. Fl. taur. n.* 813. D. *cinnamomeus. Sibth. n.* 966. (Ex Synonimiâ Tournefortii.)—Circà Odessam, in pascuis. Julio floret. ♃

382. D. *guttatus. Marsch. Fl. taur. n.* 811.—In pascuis circà Odessam haud rarè. ♃

383. SILENE *gigantea. Sp. pl.* 598. *Sibth. n.* 1011.—In rupibus insulæ Sami. Maio florens. ♃

384. S. *sedoïdes. Desf. Atl.* 2. *p.* 449. *D. C. Fl. fr. sup. n.* 4346 (*a*).—In insulâ Astypalæâ, copiosè ad latera vulcani Camini propè Theram. Maio florens. ☉

385. S. *Italica. Sibth. n.* 1006. *Cucubalus italicus. Sp. pl.* 593. *Marsch. Fl. taur. n.* 823.—In summis montibus insulæ Coi, ad littora Ponti-Euxini in Colchide haud rara. Maio, junio. ♂

386. S. *densi-flora.* Caulibus numerosis viscosis pubescentibus, foliis radicalibus spathulatis, supernis linearibus sessilibus, omnibus pubescentibus mollissimis, flo-

ribus minimis numerosissimis in verticillis compactis, infernis distantibus, summis ferè continuis.

Affinis valdè S. *otiti*. Certè tamen differt staturâ altiori, floribus multò magis numerosis, verticillis densis ferè sessilibus, bracteis margine ciliatis, foliis et caule magis pubescentibus.

Abundat in pascuis Tauriæ, propè Kerch. Maio floret. ♃

387. S. *Urvillii*. *Monagr. inéd. du genre Silene. Schott.*

S. Caule basi suffruticoso ramosissimo glabro, ramis erectis infernè foliosis supernè nudis, foliis brevibus fasciculatis mucronatis pungentibus, floribus terminalibus et lateralibus plerùmquè solitaribus, calycibus lævibus striatis, clavatis, petalis semi-bifidis.

Planta spectanda crescens in dumetis densis rotundatis echinatis, foliis lætè virentibus acutissimis, floribus amœnis patentibus extùs purpureo-viridibus intùs pallentibus.

In summo cacumine insulæ Coi, inter rupes ferè nudas ad altitudinem 400 hexapodum. Maio floret. ♃

388. S. *conica*. *Sp. pl.* 598. *Sibth. n.* 997. *Marsch. Fl. taur. n.* 838.—In pascuis Tauriæ frequens. ☉

In arenis insulæ Meli varietatem legi notandam, caulibus strictis patulis basi ramosis, foliis crassis brevibus obtusis approximatis, calycibus viscidis, floribus intensè purpureis. ♃ ?

389. S. *bipartita*. *Desf. atl.* 1. *p.* 352. S. *vespertina*. *Sibth. n.* 980.—In maritimis insulæ Melitæ copiosissimè. Aprili floret. ☉

390. S. *ciliata*. *Wild. Sp.* 2. *p.* 693.

Lychnis sylvestris Cretica, behen albo similis, parvo flore purpurascente, calyce striato. *Gundelsheimer in Herb. Tourn.*

Præcedenti nimis affinis; differre tamen videtur caulibus suberectis strictioribus villosis, foliis latioribus, petalis pallidioribus atque calycibus apice ciliatis. — In arenis insulæ Meli frequens. Aprili. ⊙

391. S. *fabaria. Sibth. n.* 987. *Cucubalus fabarius. Sp. pl.* 591.

Lychnis maritima, behen albo similis, anacampserotis folio. *Gundelsheimer in Herb. Tourn.* — Non rara in lazaret Odessæ. ♃

392. S. *behen. Sp. pl.* 599. *Sibth. n.* 988. — In arvis insulæ Meli. ⊙

393. S. *gallica. Sp. pl.* 595. *Sibth. n.* 978. — Abundat in agris Meli. Aprili. ⊙

394. S. *dichotoma. Lin. Wild.* 2. *p.* 699. *Sibth. n.* 984. *Marsch. Fl. taur. n.* 826. — Lychnis Armenia, saponariæ folio subhirsuto. *Gundelsheimer in Herb. Tourn.* — In lazaret Odessæ, in scopulo Sto-Joanne propè Sisopolim in Bulgariâ. ♂

395. S. *cretica. Sp. pl.* 601. *Sibth. n.* 996.

Lychnis Cretica angustifolia, floribus pediculis longissimis insidentibus, capsulâ pyramidatâ. *Herb. Tourn.* — In arvis insulæ Meli frequens, propè monasterium. Aprili floret. ⊙

396. ARENARIA *glomerata. Marsch. Fl. taur. n.* 865. Q. *fasciculata. Palbas. Ind. taur.* — Vulgaris in collibus aridis ad ruinas veteris Chersonnesi. Junio florens. ♂

397. A. *trinervia. Sp. pl.* 605. *Sibth. n.* 1022. *Marsch. Fl. taur. n.* 847.—In Colchide frequens ad sepes, propè Soukoum. ⊙

398. A. *pubescens.* Undique pubescens, caulibus patulis ramosis elongatis, foliis ovatis acutis subpetiolatis, calycibus acutis corollâ brevioribus.

Affinis A. *ciliatæ*, sed differt pube densâ in omnibus partibus sparsâ calycibus villosis non striatis et foliis angustioribus.—In summis montibus insulæ Coi, ad altitudinem 400 hexapodum. Maio floret. ♄

399. A. *serpylli-folia. Sp. pl.* 606. *Sibth. n.* 1026. *Marsch. Fl. taur. n.* 848.—Communis in Tauriæ pascuis. ⊙

IV. PENTAGYNIA.

400. COTYLEDON *umbilicus. Sp. pl.* 615. *b. Sibth. n.* 1041.—In rupibus vulcani Gamini propè Theram maio. ♄

401. C. *parviflora. Sibth. n.* 1043.

C. cretica, tuberosâ radice, flore luteo parvo. *Tourn. Cor.* 2. *Herb. Tourn.*—In rupibus elatis insulæ Coi. Maio floret. ♄

402. C. *Samium. Sedum libanoticum. Sp. pl.* 617. Non *Cotyledon libanoticum. Labillardière.*

C. caule simplici glabro folioso, foliis radicalibus fasciculatis longis carnosis spathulato-lanceolatis, caulinis sessilibus ferè linearibus, floribus racemosis pedicellatis sæpius binis.

A specie quam descripsit *Cl. Labillardière* nostra satis differt foliis radicalibus longis nec retusis, floribus nullo modo paniculatis sed racemosis, racemo longitu-

dine caulis.—In rupibus elatis et nudis insulæ Sami. Junio florens. ♃

403. SEDUM *hybridum. Sp. pl.* 617.

Anacampseros minor repens, flore purpureo. *Buxbaum. Cent.* 1. *p.* 33. *t.* 61. *f.* 2.

Circà Trapezum frequens, ad sepes. Junio floret. ♃

404. S. *heptapetalum. Poiret. Ency.* 4. *p.* 630. *D. C. Fl. fr. n.* 3620.—In rupibus nudis insulæ Melitæ haud rarè aprili floret. ☉

405. S. *turgidum. D. C. Fl. fr. n.* 3614?

S. foliis semi-cylindricis brevibus remotis, floribus albis cymosis, calyce brevissimo, petalis acutis, caule repente glaberrimo supernè tantùm ramoso.

In cacumine montis Athonis. Augusto florens. ♆

406. S. *pallidum. Marsch. Fl. taur. n.* 873?

S. caule glabro basi repente ramosissimo, foliis obtusis teretiusculis sessilibus ferè amplexicaulibus, cymâ ramosâ, floribus secundis, petalis aristato-acuminatis, capsulis stellatis.

Flores pallidè lutei. Frequens in lazaret Sevastopolis. Julio floruerat. ♃

407. S. *stellatum. Sp. pl.* 617. *Sibth. n.* 1046.—In rupibus insulæ Meli ubique reperitur. Aprili. ☉

408. AGROSTEMMA *coronaria. Sp. pl.* 625. *Sibth. n.* 1063. — In nemoribus Bulgariæ ad pagum Inceda. ♂

409. LYCHNIS *dioïca. Sp. pl.* 626. *Sibth. n.* 1068. L. *alba. Marsch. Fl. taur. n.* 880.—Flores semper albi. — In Tauriæ herbidis copiosè occurrit. Propè urbem Kerch. ♃

410. CERASTIUM *pilosum. Sibth. n.* 1073.

C. caule ramoso patentissimo, foliis ovatis obtusis, calycibus acutissimis longissimè pilosis.

In collibus insulæ Meli, aprili floruerat. ⊙

411. C. *manticum. Sp. pl.* 629. *Stellaria mantica. D. C. Fl. fr. n.* 4436. — Circà Byzantium in summo monte Bougourlou copiosè maio floret. ⊙

XI. DODECANDRIA.

I. MONOGYNIA.

412. PEGANUM *harmala. Sp. pl.* 638. *Sibth. n.* 1082. *Marsch. Fl. taur.* 896. — In ruderatis frequens, circà Thessalonicam, Athenas, Theodosiam, Sevastopolem, Odessam, etc. Julio floret. ♃

413. LYTHRUM *salicaria. Sp. pl.* 640. *Sibth. n.* 1084. — Ad Lernæ paludem in Argolide. ♃

414. L. *hyssopi-folium. Sp. pl.* 642. *Sibth. n.* 1086. — Ad rivos in insulâ Coo haud rarè. ⊙

II. TRIGYNIA.

415. RESEDA *alba. Sp. pl.* 645. *Sibth. n.* 1093.

R. foliis calcitrapæ, flore albo. *Icon. Aubriet.* — Copiosa in arvis insularum Melitæ et Meli. ⊙

416. R. *lutea. Sp. pl.* 645. *Sibth. n.* 1094. — In arvis insulæ Meli, in herbidis Tauriæ. Maio. ♃

417. R. *luteola. Sp. pl.* 643. *Sibth. n.* 1090. — In collibus Bulgariæ haud rara. ⊙

418. EUPHORBIA *dendroïdes. Sp. pl.* 662. *Sibth. n.* 1118. — In petrosis maritimis circà Naupliam copiosissima. ♄

419. E. *fruticosa. Bivona-Bernardi. Sic. pl. c.* 1. *p.* 35. E. *spinosa. Sp. pl.* 655. *Sibth. n.* 1106. *Var.* A. *Desf. Atl.* 1. *p.* 380.

Tithymalus maritimus spinosus. *Herb. Tourn.*

Suffrutex rotundatus densus undique echinatus. — In collibus apricis Astypalææ, Leri, Sami, etc. ♄

420. E. *canescens. Sp. pl.* 652. *Marsch. Fl. taur. n.* 908. E. *chamæsyce var. b. Sibth. n.* 1098. — Tithymalus exiguus villosus, nummulariæ folio. *Tourn. Inst.* 87. *Herb. Tourn.*—In arenosis Sami, in campis Argolicis. Julio florens. ☉

421. E. *acuminata. Lamarck. Ency.* 2. *p.* 427. *Marsch. Fl. taur. n.* 912.—In arvis Argolicis frequentissima. Julio floret. ☉

422. E. *aspera. Marsch. Fl. taur. n.* 927. *Poiret. Ency. n.* 136.

Tithymalus Cappadocicus, latissimo folio, villosus, flore aureo, non lunato. *Herb. Tourn.*—In sylvis circà Trapezum. Floret junio. ♃

423. E. *apios. Sp. pl.* 656. *Sibth. n.* 1104. — Ad sepes, circà Trapezum. Junio floret. ♃

424. E. *platyphylla. Sp. pl.* 660. *Marsch. Fl. taur. n.* 925. — Circà Byzantium frequens ad sepes. ☉

425. E. *micrantha. Linn. Ed. Wild.* 2. *p.* 905. *Marsch. Fl. taur. n.* 924.—In Colchide copiosè, circà Soukoum crescit. ☉

426. E. *pubescens. Desf. Atl.* 1. *p.* 386. *D. C. Fl. fr. n.* 2173. — In insulâ Lero rariùs inveni. Junio floret. ♂

427. E. *tenui-folia. Marsch. Fl. taur. n.* 916. *Non D. C. Fl. fr. n.* 2149.

Tithymalus Galaticus, longissimo et angustissimo folio. *Gundelsheimer in Herb. Tourn.*

In lazaret Theodosiæ. Junio florens. ♃

428. E. *Gerardiana. Wild. Sp.* 2. *p.* 920. *Sibth. n.* 1119. *Marsch. Fl. taur. n.* 931.—In arenis insulæ Lemni, in lazaret Odessæ vulgaris. ♃

429. E. *myrsinites. Sp. pl.* 661. *Sibth. n.* 1121. *Marsch. Fl. taur. n.* 923.—Haud rara in collibus apricis, circà Sevastopolem. ♃

430. E. *glareosa. Marsch. Fl. taur. n.* 918.

E. umbellâ quinquefidâ, foliis spathulato-lanceolatis mucronatis coriaceis serrulatis, involucris ovatis, involucellis reniformibus, calycinis segmentis subemarginatis, capsulis glabris.

Tithymalus orientalis, amygdali folio. *Herb. Tourn.*

In collibus siccis vulgaris propè Sevastopolem, julio ineunte floruerat. ♃

431. E. *biglandulosa. Desf. Ann. mus. vol.* 12. *p.* 114. E. *rigida. Marsch. Fl. taur. n.* 922.

Tithymalus græcus, amygdali folio acutissimo et glauco, caule purpureo. *Tourn. Cor.* 1.

In summis montibus insulæ Coi valdè frequens, ad altitudinem 3-400 hexapodum. Maio floret.

432. E. *valerianæ-folia. Lamarck. Ency.* 2 *p.* 435. *Tourn. Cor.* 1. *Desf. Cor. p.* 90. *tab.* 69.

Tithymalus græcus annuus, valerianæ rubræ folio. *Icon. Aubriet.* — In arenis maritimis insulæ Coi, maio floret. ♃

IV. PENTAGYNIA.

433. GLINUS *lotoïdes. Sp. pl.* 663. *Sibth. n.* 1126. —In arvis Argolicis augusto florens. ☉

XII. ICOSANDRIA.

I. MONOGYNIA.

434. PRUNUS *mahaleb. Sp. pl.* 678. *Sibth. n.* 1139. Vulgatissima in sepibus circà Byzantium, ineunte maio floret. ♄

II. PENTAGYNIA.

435. CRATÆGUS *Orientalis. Marsch. Fl. taur. n.* 950. *Maspilus tanaceti-folia* ? *Sibth. n.* 1150.—In sylvis Colchidis communis. Junio florens. ♄

436. MESPILUS *Germanica. Sp. pl.* 684. *Sibth. n.* 1145. *Marsch. Fl. taur. n.* 953. — Valdè frequens in nemoribus Colchidis, ad arcem Soukoum-Kale. ♄

437. MESEMBRIANTHEMUM *nodi-florum. Sp. pl.* 687. *Sibth. n.* 1162.—In arenosis insularum Meli, Leri haud rarum. ☉

III. POLYGYNIA.

438. RUBUS *fruticosus. Sp. pl.* 707. *Marsch. Fl. taur. n.* 986. — In sepibus Colchidis haud rarè invenitur. ♄

439. ROSA *canina. Sp. pl.* 704. *Marsch. Fl. taur. n.* 982.—In dumetis Colchidis frequens. ♄

440. POTENTILLA *reptans. Sp. pl.* 714. *Marsch. Fl. taur. n.* 1005. — Ad sepes in Colchide communis. ♃

441. P. *argentea. Sp. pl.* 712. *Marsch. Fl. taur. n.* 1000. — In pascuis Odessæ, ad sepes Colchidis, in collibus propè Trapezum haud infrequens. ♃

442. P. *laciniosa. Kitaïbel* ?

Calyces nunquàm pinnatifidos vidi ; cæterùm planta nostra omninò similis speciei quam descripsit *Kitaïbel.*

Ad sepes in Colchide copiosè, ad pagum Soukoum. Junio floret. ♃

443. P. *obscura. Lin. Ed. Wild.* 2. *p.* 1100. *Marsch. Fl. taur. n.* 997.—In pascuis Odessæ ubique reperitur. Junio. ♃

XIII. POLYANDRIA.

I. MONOGYNIA.

444. CAPPARIS *rupestris. Sibth. n.* 1190.—C. non spinosa, fructu majore. C. B. *Icon. Aubriet.*

C. inermis, pedunculis unifloris solitariis folio longioribus, foliis subrotundatis carnosis deciduis, capsulis ovalibus.

Frequens in rupibus insulæ Scyri, ad *Carcera Alcibiadis* circà Athenas copiosissimè. Julio floret. ♄

445. CHELIDONIUM *glaucium. Sp. pl.* 724. *Marsch. Fl. taur. n.* 1026. *Glaucium luteum. Sibth. n.* 1193. —In Colchidis arenosis, circà Soukoum. ♃

446. C. *corniculatum. Sp. pl.* 724. *Marsch. Fl. taur. n.* 1027. *Glaucium Phœniceum. Sibth. n.* 1195.—In herbidis Tauriæ, propè Kerch. ☉

447. PAPAVER *hybridum. Sp. pl.* 725. *Sibth. n.* 1197. *Marsch. Fl. taur. n.* 1029.—Circà Theodosiam haud rarè reperitur. ☉

448. CISTUS *Creticus. Sp. pl.* 738. *Sibth. n.* 1211.

C. ladanifera Cretica, flore purpureo. *Tourn. Cor.* 19.

Herb. Tourn.—Copiosè crescit in insulâ Melo; aprili florens. ♄

449. HELIANTHEMUM *guttatum. Sp. pl.* 741. C. *guttatus. Sibth. n.* 1219. —Valdè commune in insulâ Melo. ○

450. H. *arabicum. Cistus arabicus. Wild. Sp.* 2. *p.* 1210. *Desf. atl.* 1. *p.* 419.

H. Creticum, linariæ folio, flore croceo. *Herb. Tourn.* — In apricis insulæ Meli, valdè frequens. Maio floret. ♄

II. PENTAGYNIA.

451. DELPHINIUM *consolida. Sp. pl.* 748. *Sibth. n.* 1233. *Marsch. Fl. taur. n.* 1046.—In herbidis copiosum circà Theodosiam et Odessam. Maio floret. ⊙

452. D. *staphysagria. Sp. pl.* 750. *Sibth. n.* 1237. —Ad muros in insulâ Lero vulgare. Junio floret. ♂

453. D. *cardiopetalum. D. C. Syst. univ.* 1. *p.* 347? D. *peregrinum. Lam. Ency.* 2. *p.* 264.

C. lati-folium, parvo flore. *Tourn. Inst.* 426. *Herb. Vaillant.*

Planta nostra pubescens in omnibus partibus, capsulas usque, floresque pallidè cœrulei. Quasi media inter D. *cardiopetalum* et D. *junceum. D. C.*

Frequens in campis arenosis insulæ Scyri. Junio florens. ⊙

454. D. *junceum D. C. Syst. univ.* 1. *p.* 348. D. *peregrinum. Sp. pl.* 749. *Sibth. n.* 1235.

D. græcum, foliis inferioribus fumariam, superioribus linariam referentibus. *Tourn. Cor.* 30. *Herb. Jussieu. Herb. Vaillant.*

In arvis insulæ Sami, in peninsulâ montis Athonis copiosè. Julio floret. ⊙

455. NIGELLA *arvensis. Sp. pl.* 753. *Sibth. n.* 1243. *Marsch. Fl. taur. n.* 1057. — In pascuis Odessæ minimè rara. ⊙

456. N. *aristata. Sibth. n.* 1241.

N. floribus foliis supernis sæpiùs cinctis, nectariis antherisque aristatis, capsulis turbinatis muricatis subseptenis, petalis stipitatis cordiformibus apice acuminatis.

Flos non verè involucratus sed foliis extremis plerumque cinctus; folia glauca stricta, rami rigidi divaricati, nectaria hispida. — In insulis Astypalæâ et Tenedo frequens. Junio floret. ⊙

457. HYPERICUM *tomentosum. Sp. pl.* 1106. *D. C. Fl. fr. n.* 4580. — In udis insulæ Melitæ reperitur. Aprili floret. ♄

458. H. *origani-folium. Wild. Sp.* 3. *p.* 1467. *Sibth. n.* 1862.

H. armenum saxatile, majoranæ folio. *Tourn. Cor.* 18. *Gundelsheimer in Herb. Tourn.*

In calycibus puncta glandulosa non vidi, sed numerosa sunt in petalorum margine. — Copiosè circà Byzantium, in monte Bougourlou. Floret maio. ♄

459. H. *lanuginosum. Lamarck. Ency.* 4. *p.* 171. *Sibth. n.* 1861.

Puncta glandulosa non tantùm in margine foliorum sed etiam in disco supernorum sæpè videas.

In insulâ Samo, propè urbem Vathi, junio florens legi. ♄

460. H. *crispum. Lin. Mant.* 106. *Sibth. n.* 1856.

H. crispum fruticosum maximè ramosum, foliis caulem ambientibus. *Herb. Tourn.*

In cunctis insulis Archipelagi, necnon in Græciâ frequens in dumetis 2-3 pedes latis et longis. Maio floret. ♄

461. H. *empetri-folium. Wild. Sp.* 3. *p.* 1452. *Sibth. n.* 1852.

H. Syriacum et Alexandrinum. *Herb. Tourn. Icon. Aubriet.*

H. caule fruticoso erecto ramoso, floribus trigynis corymbosis terminalibus, foliis verticillatis ternis, linearibus, margine revolutis, calycibus brevissimis obtusis punctato-glandulosis.

Frutex elegans sæpiùs 2-3 pedalis quandòque 6-7 pedalis, ramis erectis foliosis, foliis perforatis subimbricatis, calycibus corollâ saltèm triplò brevioribus et margine evidenter glandulosis.

In collibus insulæ Coi nemora efficit. Maio floret. ♃

462. H. *inodorum. Wild. Sp.* 3. *p.* 1449.

H. cappadocicum, frutescens, fætido simile sed inodorum. *Herb. Tourn.* — In Colchide ubique reperitur. Ad sepes, junio floret. ♃

463. H. *ciliatum. Lamarck. Ency.* 4. *p.* 170. *Wild. Sp.* 3. *p.* 1463. *Desf. Cor. p.* 70. *t.* 53. — Propè Byzantium, in monte Bougourlou. Floret maio. ♄

464. H. *perforatum. Lin. Ed. Wild.* 3. *p.* 1470. *Marsch. Fl. taur. n.* 1561.—In collibus herbidis, circà Odessam. Julio florens. ♃

465. H. *perforatum. Sp. pl.* 1105. *Sibth. n.* 1855. *Marsch. Fl. taur. n.* 1557. In Colchide ad pagum

Soukoum, circà Trapezum, Sevastopolem, Odessam planta vulgaris. ♃

III. POLYGYNIA

466. THALICTRUM *minus. Sp. pl.* 969. *Sibth. n.* 1257. *Marsch. Fl. taur. n.* 1072.—Circà Odessam; julio floret. ♃

467. ADONIS *dentata. D. C. Syst. univ.* 1. *p.* 224. Ranunculus arvensis, foliis chamæmeli, flore citrino. *Herb. Tourn.*

A. caule striato duro ramoso, petalis planis oblongis calyce paulò longioribus, fructibus basi tuberculatis in spicam elongatam dispositis.

Calyces violacei basi pubescentes; flores parvi, flavi unguibus nigricantibus.—In arvis maritimis insulæ Meli. Aprili floret. ⊙

468. A. *micrantha. D. C. Syst. univ.* 1. *p.* 222? *Marsch. Fl. taur. n.* 1073. * *Var.*

A. caule filiformi subsimplici, floribus minimis longè pedunculatis, petalis angustissimis ferè linearibus calyce duplò longioribus, carpellis subreticulatis in caput ovatum aggregatis.

Caulis spithamæus: corolla vix magnitudine *Ranunculi arvensis:* petala subseptena flammea.—In lazaret Odessæ copiosè floret maio. ⊙

469. RANUNCULUS *Illyricus. Sp. pl.* 776. *Sibth. n.* 1270. *Marsch. Fl. taur. n.* 1081. R. *sericeus. Wild. En.* 589.

R. lanuginosus, angustifolius, grumosâ radice, major. C. B. *Herb. Tourn.*

Frequenter in Tauriæ pascuis, ad oppidum Kerch. Maio floret. ♃

470. R. *oxyspermus. Wild. Sp.* 2. *p.* 1328. *Marsch. Fl. taur. n.* 1088. *D. C. Syst. univ.* 1. *p.* 258. — In pascuis Tauriæ, circà Theodosiam et Kerch nequaquàm rarus. Floret maio. ♃

471. R. *muricatus. Sp. pl.* 780. *Sibth. n.* 1280.— In paludosis insulæ Meli. ☉

472. R. *flabellatus. Desf. atl.* 1. *p.* 438. *Sibth. n.* 1277. R. *chærophyllos. Var. g. D. C. Syst. un.* 1. *p.* 255.—Copiosè crescit in montosis insulæ Meli, necnon in monte Bougourlou circà Byzantium. Floret aprili, maio. ♆

473. R. *chærophyllos. Sp. pl.* 780. *D. C. Syst. univ.* 1. *p.* 254. R. *millefoliatus*? *Sibth. n.* 1278. —Abundat in monte Bougourlou circà Byzantium, maio florens. ♃

474. R. *tripartitus. D. C. Syst. univ.* 1. *p.* 234?

R. caule natante, foliis submersis capillaceo multifidis, emersis tripartitis, lobis cuneatis obtusis apice crenatis, carpellis glabris tenuissimè transversìm striatis.

Ad torrentes in insulâ Melo. ♃

475. R. *sceleratus Sp. pl.* 776. *Sibth. n.* 1269. *Marsch. Fl. taur. n.* 1079. — In Colchidis paludosis frequens. ☉

476. R. *Constantinopolitanus.* R. *lanuginosus. Var. γ. D. C. Syst. univ.* 1. *p.* 281.

R. Constantinopolitanus, lati-folius, villosissimus. *Icon. Aubriet.*

R. caule elato lanuginoso multifloro, foliis radicalibus

amplissimis longissimè petiolatis trifidis, lobis latis subincisis, supernis laciniatis laciniis linearibus, cunctis sericeo-lanuginosis, calyce reflexo, carpellis planis suborbiculatis stylo uncinatis.

Planta speciosa affinis R. *lanuginoso*. A me tamen satis differt caulibus 3-4 pedalibus, foliorum radicalium disco 3 uncias longo latoque 5 uncias, atque calycibus reflexis.

Circà Byzantium ad sepes vulgatissima. Maio floret ♃

477. R. *bulbosus*. *D. C. Syst. univ.* 1. *p.* 295?

R. caule procumbente ramoso subvilloso, foliis radicalibus petiolatis trisectis, segmentis trifidis inciso-dentatis, medio petiolulato, sinubus obtusis, calyce reflexo.

A specie vulgari discedit caulibus procumbentibus multifloris foliisque subhirsutis, radicum fibris longissimis, necnon segmentorum sinubus valdè obtusis, undè segmenta ipsa basi miro modo attenuata videntur. Forsitàn species distincta?

In pratosis Colchidis haud rarus, circà Soukoum. Junio floret. ♃

478. R. *repens*. *Sp. pl.* 779. *Sibth. n.* 1275. *Marsch. Fl. taur. n.* 1083.—In nemoribus Colchidis, in collibus circà Trapezum minimè rarus. Junio. ♃

479. R. *marginatus*. Radice fibrosâ, caule basi ramoso patulo subhirsuto; foliis inferioribus petiolatis trissectis, segmentis crenatis obtusis, caulinorum laciniis linearibus, cunctis margine callosâ cinctis, floribus parvis, carpellis rotundatis planis marginatis stylo subuncinatis, calyce reflexo.

Species vix spithamæa valdè distincta margine semi-

num et foliorum atque parvitate florum. Petala flava. — In collibus circà Trapezum. Junio floret. ♄

XIV. DIDYNAMIA.

I. GYMNOSPERMIA.

480. AJUGA *Orientalis. Sp. pl.* 785. *Sibth. n.* 1289. *Marsch. Fl. taur. n.* 1098.—In collibus Sami, in pascuis Tauriæ propè Kerch. Maio. ♄

481. A. *chia. Wild. Sp.* 3. *p.* 11. *Sibth. n.* 1293.

Chamæpitys chia folio hispido, magno flore. *Herb. Tourn.*

Cùm plantâ *Tourn.* nostra convenit pilis densis et magnitudine floris, tantulùm differt foliorum laciniis minùs latis minùsque crassis.—Frequens in collibus apricis Tauriæ, propè Theodosiam, Kerch et Sevastopolem. Junio floret. ☉

482. A. *pseudo-iva. D. C. Fl. fr. Supp. n.* 2496(a).

Chamæpitys montana, foliis serratis, Lusitanica, flore luteo. *Herb. Tourn.* — In aridis insulæ Leri. Maio florens. ♄ ?

483. TEUCRIUM *fruticans. Sp. pl.* 787. *Sibth. n.* 1297.

Abundat in Melitâ, sed nec in Archipelago nec in Græciâ unquàm reperi. Aprili floret. ♄

484. T. *brevi-folium. Wild. Sp.* 3. *p.* 17. *Sibth. n.* 1291.

T. frutescens, stœchadis arabicæ folio et facie. *Herb. Tourn.*—In saxosis insularum Meli et Astypalææ, maio florens.

485. T. *flavum. Var. b. Wild. Sp.* 3. *p.* 31. *Schre*

ber. Unil. p. 34. *n.* 23. T. *chamædrys major. Desf. Cat. H. P. p.* 69.

Teucrium Creticum, odoratum, flore purpureo. H. R. Par. *Herb. Tourn. Herb. Vaillant.*

Chamædrys fruticosa Cretica, purpureo flore. *Tourn. Inst.* 205. *Herb. Tourn.*

T. caule fruticoso erecto, foliis arctè ovatis leviter pubescentibus anticè dentatis, floralibus integerrimis sessilibus, verticillis ramosis.

Caules numerosi pedales sesquipedalesve; flores amœnè purpurei. Nonne species distincta? Copiosissimè crescit in scopulo St.-Istad propè Cimolum. Maio florens. ♄

486. T. *chamædrys. Sp. pl.* 790. *Sibth. n.* 1305. *Marsch. Fl. taur. n.* 1109.—Circà Sevastopolem haud rarum, necnon propè Trapezum. ♃

487. T. *polium. Sp. pl.* 792. *Sibth. n.* 1309. *Marsch. Fl. taur. n.* 1111.—In apricis propè Sevastopolem minimè rarum. Junio ♃

488. T. *capitatum. Sp. pl.* 792. *Sibth. n.* 1310.—In collibus insulæ Leri. Maio florens. ♃

489. T. *lamii-folium.* Caule herbaceo basi ramoso villoso, foliis petiolatis subcordatis obtusis crenatis, spicâ terminali nudâ densâ; bracteis subulatis, calycis lobo superiori squamiformi.

Caulis pedalis seu sesquipedalis undique hirsutus, folia longè petiolata obtusè dentata, spica cylindrica 2-3 uncialis densissima, flores pallidi parvi, calyces deflexi lobo superiori lato squamiformi, undè primo intuitu planta *Scutellariam* refert.

Cassida orientalis, Lamii villoso folio, flore purpurascente. *Shevard in Herb. Vaillant.*

Habitat in nemoribus Bulgariæ, ad pagum Incada. Junio floret. ♂

490. SATUREIA *nervosa*. *Desf. Atl.* 2. *p.* 9. *Sibth. n.* 1315.

Clinopodium Græcum, foliis lanceolatis, perenne, fortè hyssopus Græcorum. *P. Alp. Herb. Tourn.*—In petrosis insulæ Meli ubique occurrit. Aprili florens. ♄

491. S. *thymbra*. *Sp. pl.* 794. *Sibth. n.* 1316. Thymbra legitima. *Tourn. Inst.* 797. *Gundelsheimer in Herb. Tourn.*—In insulis Archipelagi copiosissimè. Maio, junio floret. ♄

492. S. *Græca*. *Sp. pl.* 794. *Sibth. n.* 1317.—In rupibus elatis insularum Coi et Sami rarius. Florens junio. ♃

493. S. *juliana*. *Sp. pl.* 793. *Sibth. n.* 1314.

Thymbra Sancti Juliani, sive satureia vera. *Lobel. Herb. Tourn.*—In saxosis insularum Coi et Leri; sed in Samo frequens. Junio. ♃

494. S. *capitata*. *Sp. pl.* 795. *n.* 1319.

Frutex elegans humilis, gratè odorus, in dumetis densissimis rotundatis et undiquè floribus coronatis.—In cunctis Archipelagi insulis copiosissimè. Æstate floret. ♄

495. THYMBRA *spicata*. *Sp. pl.* 795. *Sibth. n.* 1321.—In ericetis Sami propè urbem Metelinous semel reperi. Junio floret. ♄

496. NEPETA *cataria*. *Sp. pl.* 796. *Sibth. n.* 1322. *Marsch. Fl. taur. n.* 1115.—In apricis, ad ruinas veteris Chersonnesi. ♃

497. N. *melissæ-folia*. *Desf. Cor. p.* 19. *t.* 12.

Nepeta Cretica, melissæ-folio, asphodeli radice. *Herb. Tourn. Icon. Aubriet.*—In collibus aridis insulæ Meli, circà monasterium et propè tumulos. Aprili floret. ♀

498. N. *Ukranica. Sp. pl.* 797. *Marsch. Fl. taur. n.* 1121.—In lazaret Odessæ, julio florens. ♃

499. SIDERITIS *Taurica. Marsch. Fl. taur. n.* 1124. S. *Syriaca. Pallas. Ind. Taur.* —In apricis Tauriæ, circà Sevastopolem minimè rara. Julio floret. ♃

500. S. *montana. Sp. pl.* 802. *Sibth. n.* 1361. *Marsch. Fl. taur. n.* 1123.—In aridis Tauriæ frequens, circà Sevastopolem. Floret julio. ☉

501. S. *remota.* Herbacea ebracteata; calycibus corollâ majoribus spinosis, tomento denso et incano tectis; ramis patulis rigidis divaricatis, verticillis remotissimis.

Præcedenti affinis; sed dignoscitur verticillis internodiis saltem triplò brevioribus, calycibusque cano-tomentosis. Culta characteres servat.—In collibus insulæ Sami. Junio floret. ☉

502. S. *elegans. Murr. amœn. Goett. p.* 92. *Wild. Sp.* 3. *p.* 64. S. *nigricans. Retzius. Syn.* 2. *p.* 117. —In arvis insulæ Leri; maio florens. ☉

503. S. *Romana. Sp. pl.* 802. *Sibth. n.* 1332.—Ad margines viarum in insulâ Melitâ, in arvis Leri. Maio. ☉

504. MENTHA *pulegium. Sp. pl.* 803. *Sibth. n.* 1343. *Marsch. Fl. taur. n.* 1129.—In inundatis Bulgariæ, ad pagum Sisipoli. ♃

505. M. *sylvestris. Sp. pl.* 804. *Sibth. n.* 1337.—In Bulgariâ frequens ad radices montis Hæmi. ♃

506. M. *viridis*. *Sp. pl.* 804. *D. C. Fl. fr. n.* 5556. — Cum præcedente reperitur. ☿

507. M. *tomentosa*. Caule adscendente tomentoso supernè ramosissimo, foliis tomentosis sessilibus crispis lanceolato-linearibus grossè dentatis, suprà obscuris subtus incanis, calycibus minimis villosis, staminibus corollâ longioribus, spicis numerosissimis longis basi interruptis.

Affinis M. *niliacæ*. *Vahl.*, sed differt foliis crispis et longioribus. Caulis etiam magis ramosus. — Ad fontes insulæ Scyri; julio floret. ☿

508. LAMIUM *calycinum*. Caule suberecto ramoso glaberrimo fistuloso, foliis cordatis rugosis lanatis pubescentibus, summis etiam subpetiolatis, calycibus lævibus reticulatis flori subæqualibus, dentibus calycinis longissimis arcuatis subulatis vix ciliatis, floribus confertis sessilibus, verticillis numerosis infernè remotis.

Flores albidi, corolla extùs villosa.

In ruderatis insulæ Sami propè columnam veteris Heræi. Junio florens. ☿

509. STACHYS *sylvatica*. *Sp. pl.* 811. *Sibth. n.* 1354. *Marsch. Fl. taur. n.* 1138. — In nemoribus Colchidis, ad pagum Soukoum. ☿

510. S. *Germanica*. *Sp. pl.* 812. *Sibth. n.* 1357. *Marsch. Fl. taur. n.* 1140. — In sylvis Bulgariæ, ad pagum Ineada. ☿

511. S. *Orientalis*. *Sp. pl.* 813? *Sibth. n.* 1362? — In collibus insulæ Coi, necnon circà Trapezum frequens. Junio floret. ☿

512. S. *lanata*. *Wild. Sp.* 3. *p.* 100. *Sibth.*

n. 1358. *Marsch. Fl. taur. n.* 1141.—In apricis Tauriæ, circà Sevastopolem copiosè. Junio, julio. ♃

513. S. *maritima. Lin. Mant.* 82. *Sibth. n.* 1364. —Ad littora maris, in Colchide propè artem Soukoum-Kale. Junio floret. ♃

514. S. *annua. Sp. pl.* 813. *Sibth. n.* 1366. *Marsch. Fl. taur. n.* 1144.—Circà Trapezum. ad fluvium Pyxitim. Junio florens. ☉

515. S. *recta. Lin. Mant.* 82. *Sibth. n.* 1365. *Marsch. Fl. taur. n.* 1142.

In plantâ nostrâ, folia omnia angusta ferè linearia, bracteæ subulatæ, dentesque calycis spinosæ.—Haud infrequens in herbidis Odessæ. Julio floret. ♃

516. S. *betonicæ-folia. Desf. Cor. p.* 22. *t.* 14. S. *spinulosa? Sibth. n.* 1368.

Galeopsis Cretica, betonicæfolio, flore flavescente. *Herb. Vaillant.*

S. caule erecto stricto quadrangulo, angulis spinuloso-asperrimis, foliis petiolatis cordatis venosis crenatis, verticillis subspicatis plerumque sexfloris; calycibus pilosis spinulosis, floribus magnis calyce duplò longioribus.

Corolla pallidè flavescens sublanata. Circà Byzantium frequens ad sepes, in littore Asiatico. Maio floret. ♂

517. S. *arenaria. Vahl. Symb.* 2. *p.* 64. — Circà Trapezum, in incultis communis. Junio floret. ♃

518. S. *congesta.* Caule basi ramoso prostrato tomentoso, foliis oblongo-ovatis crenulatis incanis, floribus congestis in spicâ densâ breviori, corollâ extùs pilosâ.

S. *arenariæ* nimiùm affinis; discedit tamen pube densâ tomentosâ, foliis brevioribus ovatis, caule crassiori quamvis

breviori, spicâ florum congestâ densâ abbreviatâ nunquàm basi interruptâ.

Betonica Orientalis, sideritdis facie, flore purpureo. *Tourn. Cor.* 13. *Herb. Vaillant.*—Circà Trapezum ad ripas fluvii Pyxitis. Junio floret. ☿

519. MARRUBIUM *peregrinum. Sp. pl.* 815. *Sibth. n.* 1370. *Marsch. Fl. taur. n.* 1150.—In apricis circà Sevastopolem copiosum. Julio floret. ☿

520. M. *creticum. Wild. Sp.* 3. *p.* 110. *Sibth. n.* 1371. M. *peregrinum. b. Sp. pl.* 816.

Fortasse præcedentis mera varietas. Differt tantùm foliis angustioribus utrinque canis, dentibus calycinis paulò longioribus, spicis florum minimis interruptis. Ad sepes in insulâ Lesbo frequens. Junio floret. ☿

521. M. *acetabulosum. Sp. pl.* 817. *Sibth. n.* 1375.

Pseudodictamnus acetabulis moluccæ. *Tourn. Inst.* 188. *Herb. Tourn.*—In insulis Melo, Therâ, Astypalæâ, Samo etc. minimè rarum. Maio, junio florens. ♄

522. M. *vulgare. Sp. pl.* 816. *Sibth. n.* 1373.—In insulâ Coo, ad sepes. ☿

523. BALLOTA *nigra. Sp. pl.* 814. *Marsch. Fl. taur. n.* 1147.

Planta nostra differt à specie Gallicâ foliis amplissimis calycibus glabris acuminato-spinulosis, floribusque duplò majoribus.—Circà Theodosiam, in ruderatis copiosa. Junio floret. ☿

524. LEONURUS *villosus. Desf. Cat. H. P. p.* 73.

L. caule erecto villoso, foliis utrinque pubescentibus cunei-formi-ovatis trilobis, lobis longis acutis dentato-laciniatis, calycibus confertis floribusque cano-tomentosis.

Cum L. *cardiacâ* confundi non potest. Caulis elatus saltem 5-6 pedalis, planta undique pubescens, flores duplò majores et multò magis numerosi.

Cum præcedente in ruderatis Theodosiæ copiosissimè. Floret junio. ☿

525. PHLOMIS *pungens. Wild. Sp.* 3. *p.* 191. *Marsch. Fl. taur. n.* 1165.

Phlomis orientalis, hormini-folio, flore minore, calyce glabro. *Tourn. Cor. Herb. Jussi.*

Omnino similis P. *herba-venti.* Differt tantùm foliis angustioribus, caule calycibus foliisque minùs tomentosis. — Circà Theodosiam. Junio ☿

526. P. *fruticosa. Sp pl.* 818. *Sibth. n.* 1377. — In collibus insularum Meli et Scyri vulgaris. Maio florens. ♄

527. P. *Samia. Sp. pl.* 819. *Sibth. n.* 1378.—Communis in collibus circà Trapezum. Junio floret. ☿

528. CLINOPODIUM *vulgare. Sp. pl.* 821. *Sibth. n.* 1384. — In collibus propè Trapezum, circà Byzantium ad sepes. ☿

529. ORIGANUM *Smyrnæum, Sp. pl.* 823. O. *onites. Sibth. n.* 1389.

Majorana Cretica, origani-folio, villosa, satureiæ odore, corymbis majoribus albis. *Tourn. Car.* 13, *Herb. Tourn.*

In collibus petrosis Astypalææ, Leri, Sami, etc. Junio, julio florens. ☿

530. O. *Creticum, Sp. pl.* 823. *Sibth. n.* 1388.

O. Creticum, C. B. *Herb. Tourn.*—In montibus insulæ Scyri rariùs, Julio floret. ☿

531. O. *vulgare. Sp. pl.* 824. *Sibth. n.* 1391. — In nemoribus Bulgariæ, ad radices montis Hæmi. ϰ

532. O. *parvi-florum.* Caule hirsuto erecto supernè ramoso, foliis oblongis subpetiolatis utrinque villosis, floribus minimis, calyce colorato tubo corollæ subæquali, spicis brevibus paniculatis.

Simillimum præcedenti; distinguitur hirsutie partium omnium, foliis longioribus internodiis, floribus duplò minoribus, præsertim brevitate tubi corollæ. — Circà Odessam minimè rarum. Julio florens. ϰ

533. THYMUS *microphyllus.* Caule basi ramoso prostrato, ramis filiformibus pubescentibus, foliis minimis ovatis nervosis, pedicellis subtrifloris axillaribus, verticillis remotis, floribus calyce duplò longioribus.

Calamintha minima, annua, thymi-folia. *Herb. Tourn. Herb. Vaill.* — In collibus aridis insulæ Melitæ copiosissimè, aprili floret. ϰ

534. T. *angusti-folius. Marsch. Fl. taur. n.* 1162. *Persoon. Syn.* 2. *p.* 130. T. *Zygis. Poiret. Ency. t.* 7. *p.* 644. *non Linnæi.* — Circà Byzantium, in monte Bougourlou. ϰ

535. T. *Zygis. Sp. pl.* 826? *Sibth. n.* 1398? Folia calycesque punctis aureis adspersa. — In collibus siccis, circà Thessalonicam frequens. ϰ

536. T. *graveolens. Marsch. Fl. taur. n.* 1165. T. *patavinus. Pallas, Ind. taur.* T. *rotundifolius. Persoon. Syn.* 2. *p.* 131.

Clinopodium Armenum, origani folio, flore minimo. *Gundelsheimer in Herb. Tourn.* — In Tauriæ herbidis, circà Kerch. ⊙

537. T. *suaveolens. Sibth. n.* 1400?

glanduloso-pilosis brevibus lanceolatis acutiusculis.

Corolla purpureo-lutea magnitudine A. *majoris*.— Suprà mœnia urbis Melitæ vulgatum. Aprili florens. ♃

550. LINARIA *triphylla. Desf. atl.* 2. *p.* 40. *D. C. Fl. fr. n.* 2639. *Antirrhinum triphyllum. Sp. pl.* 852.

Abundat in segetibus insulæ Meli, aprili florens. ☉

551. S. *cymbalaria. Sp. pl.* 851. *Sibth. n.* 1431.

Var. crassi-folia accedit ad L. *hepatici-foliam. Poiret. Ency.* foliis glaucis crassis ferè integris, differt floribus parvis et pedunculis brevioribus.

In rupibus maritimis Astypalææ, ad muros insulæ Leri. Maio floret. ♃

552. L. *pelisseriana. Sp. pl.* 855. *Sibth. n.* 1441. —In collibus Meli sat frequens. ☉

553. L. *elatines. Antirrhinum elatines. Sp. pl.* 851. *Sibth. n.* 1433.

Linaria segetum nummulariæ folio aurito et villoso, flore luteo. *Tourn.* 165. *Herb. Tourn.*—In campis incultis insulæ Leri. Maio floret. ☉

554. L. *vulgaris. D. C. Fl. fr. n.* 2654. *Antirrhinum linaria. Sp. pl.* 858. *Sibth. n.* 1447. *Marsch. Fl. taur. n.* 1201. — Circà Odessam minimè rara.

555. L. *lini-folia. Antirrhinum lini-folium. Sp. pl.* 858. *Antirrhinum genisti-folium, var. b, Marsch. Fl. taur. n.* 1200.

L. Constantinopolitana, folio lini sativi, flore luteo. *Gundelsheimer in Herb. Tourn. Buxbaum. Cent.* 1. *p.* 16. *t.* 25.—In Bulgariâ ad pagos Sisopoli et Incada. Julio floret. ♃

556. L. *genisti-folia. Antirrhinum genisti-folium,*

Sp. pl. 858. *Sibth. n.* 1446. *Marsch. Fl. taur. n.* 1200. —Abundat in lazaret Odessæ. Julio florens. ♃

557. SCROPHULARIA *lucida. Sp. pl.* 865. *Sibth. n.* 1455.

S. folio glauco, in amplas lacinias diviso. *Tourn. Cor.* 9. *Herb. Tourn. Icon. Aubriet.* —In insulâ Melo propè tumulos, ad vulcanum novæ Camini propè Theram. Aprili floret. ♃

558. S. *ramosissima, D. C. Fl. Sup. n.* 2628 (*a*). *Loisel. Fl. Gall.* 2. *p.* 381. —In collibus maritimis insulæ Scyri. Julio floruerat. ♃

559. S. *micrantha.* Caule basi ramoso glabro ascendente, ramis debilibus, foliis petiolatis oblongis obtusis basi auriculatis grossè dentatis, floribus minimis racemosis, racemo terminali composito, calycibus obtusis fructu triplò brevioribus.

Caulis pedalis sesquipedalisve, pedunculi multiflori, flores minimi saturè purpurei. —In rupibus maritimis insulæ Ferasiæ propè Theram; maio florens. ♃

560. S. *heterophylla. Wild. Sp.* 3. *p.* 274.

S. Cretica, frutescens; folio vario et carnoso. *Herb. Tourn. Icon. Aubriet.* —In rupibus insularum Meli et Ferasiæ propè Theram. Maio. ♃

561. S. *aquatica. Sp. pl.* 864. *Sibth. n.* 1451.—In humidis propè Byzantium. ♃

562. S. *melissæ-folia.* Caule erecto quadrangulari glaberrimo, foliis caulinis petiolatis ovato-lanceolatis argutè serratis, bracteis lanceolatis subserratis, pedunculis pubescentibus multifloris, paniculâ elongatâ.

S. Galatica minor, melissæ-folio. *Herb. Tourn.* flores parvi purpurei. Pedunculi tèr quatèrve dichotomi. Folia

inferna mihi non nota.—Circà Trapezum, in collibus. Junio floret. ♄

565. DIGITALIS *leucophæa*. *Sibth. n.* 1465? D. *lanata*? *Wild. Sp.* 3. *p.* 187.

D. foliis oblongis lanceolatis integerrimis, caulèque glabris, spicâ terminali cylindraceâ densissimâ sublanatâ, bracteis calyce longioribus, capsulis ovatis reticulatis.

Flores non vidi. — In nemoribus Bulgariæ, ad pagum Ineadâ. ♄

564. SESAMUM *Indicum*. *Sp. pl.* 884. — In arvis insulæ Tenedi, in agro Argolico colitur. Julio florens. ☉

565. ACANTHUS *mollis*. *Sp. pl.* 891. *Sibth. n.* 1471. — Frequentissimè in saxeis circà Trapezum. Ab incolis ut vulnerarium potens habetur. ♄

566. OROBANCHE *ramosa*. *Sp. pl.* 882. *Sibth. n.* 1469. — Vulgaris in collibus Meli. Aprili floret. ☙

567. O. *pubescens*.

O. caule erecto simplice subvilloso, bracteis lanceolatis acutis flore longioribus, corollâ fimbriato-crispâ, calyce diphyllo laciniis subbifidis, spicâ longissimâ, densissimâ; staminibus basi hirsutis.

Planta integra pilis albidis crispis conspersa, flores numerosissimi saturè violacei. — Vulgaris in collibus siccis insulæ Meli. Aprili floret. ♃

568. O. *caryophyllacea*. *Wild. sp.* 3. *p.* 348. *Sibth. n.* 1467.

O. major, caryophyllum olens. *Herb. Tourn.* — In incultis Meli. Aprili. ♄

XV. TETRADYNAMIA.

I. SILICULOSA.

569. MYAGRUM *perenne. Sp. pl.* 893. *Bunias perennis. Sibth. n.* 1478. *Rapistrum perenne. D. C. Syst. univ.* 2. *p.* 431. — In collibus aridis insulæ Astypalææ. Maio floret. ♃

570. M. *Ægyptium. Sp. pl.* 895. *Bunias virgata. Sibth. n.* 1479. *Didesmus Ægyptius. b. D. C. Syst. univ.* 2. *p.* 658.

Flores pallidi, caulis ramosissimus procumbens. — In ruderatis insulæ Astypalææ. Maio floret. ⊙

571. BRUGARIA *Aleppica. D. C. Syst. univ.* 2. *p.* 674. *Bunias myagroïdes. Mant.* 96. *Cordylocarpus lævigatus. Wild. Sp.* 3. *p.* 653. *Sibth. n.* 1583.

Sinapi maritimum, tenuissimè laciniatum, flore purpurascente. *Ins. Cyel. Herb. Tourn.* — Vulgatissima in arvis maritimis insulæ Meli. Maio floret. ⊙

572. BUNIAS *cochlearioïdes. Wild. Sp.* 3. *p.* 413. *Marsch. Fl taur. n.* 1229. — Circà Byzantium et Theodosiam non rara occurrit. ⊙

573. CRAMBE *maritima. Sp. pl.* 937. *Marsch. Fl. taur. n.* 1232. *D. C. Syst. univ.* 2. 651. — Ad littora Ponti-Euxini, versùs Bosphorum Cimmerianum. Maio florens. ♃

574. COCHLEARIA *draba. Sp. pl.* 904. *Lepidium draba. Marsch. Fl. taur. n.* 1253. *D. C. Syst. un.* 2, *p.* 529. — Communis in herbidis Tauriæ, circà Theodosiam. ♃

575. IBERIS *ciliata. Wild. Sp.* 3. *p.* 455. *Marsch.*

Fl. taur. n. 1266. *D. C. Syst. univ.* 2. *p.* 402.—In collibus apricis, circà Sevastopolem vulgaris. ♂

576. LEPIDIUM *perfoliatum. Sp. pl.* 897. *Marsch. Fl. taur. n.* 1248. *D. C. Syst. univ.* 2. *p.* 541.—Abundat in pascuis Tauriæ, circà Theodosiam et Kerch. Maio floret. ⊙

577. L. *cornutum. Sibth. n.* 1491. *Buxbaum. Cent.* 1. *p.* 5. *t.* 9. *f.* 1. *Notoceras cardamine folium. D. C. Syst. un.* 2. *p.* 205.—In Asiâ minore circà Byzantium, ad sepes. Maio floret. ⊙

578. L. *angulosum.* Caule glaberrimo flexuoso angulato sulcato stricto parcè ramoso, foliis longis glabris sessilibus cunctis pinatifidis, laciniis inciso-dentatis floribus minimis deciduis, siliculâ ovatâ subemarginatâ.

Omninò simile *L. vesicario*, sed nunquàm genicula tumida vidi. Laciniæ foliorum etiàm latiora. — Abundat in ruderatis urbis Theodosiæ. Maio floret. ⊙

579. L. *ruderale. Sp. pl.* 900. *Marsch. Fl. taur. n.* 1257. — Passim in incultis Colchidis, ad arcem Soukoum-Kale. ⊙

580. L. *Iberis. Sp. pl.* 900. *D. C. Syst. univ.* 2. *p.* 550. L. *gramini-folium. Sibth. n.* 1493. *Marsch. Fl. taur. n.* 1255.—In Bulgariâ frequens, ad pagum Ineada. ♄

581. THLASPI *saxatile. Sp. pl.* 901. *Sibth. n.* 1496. *Æthionema saxatile. Syst. univ.* 2. *p.* 553.—In summis montibus insulæ Coi; maio florebat. ♄

582. CAMELINA *dentata. Persoon. Syn.* 2. *p.* 191. *D. C. Syst. univ.* 2. *p.* 516. *Myagrum dentatum.*

Willd. Sp. 3. *p.* 408. — Abundat in herbidis circà Theodosiam et Odessam. Junio floret. ⊙

583. ALYSSUM *Orientale. D. C. Syst. univ.* 2. *p.* 303. *Sibth. n.* 1512. *Clypeola tomentosa. Lin. Mant.* 92.

A. Creticum, saxatile, foliis undulatis incanis. *Tourn. Cor.* 15. *Herb. Tourn.* — In summis rupibus insulæ Coi. Maio floruerat. ♄

584. A. *hirsutum. Marsch. Fl. taur. n.* 1275. *D. C. Syst. univ.* 2. *p.* 314? — Abundat in campis herbidis Tauriæ, propè Theodosiam atque Kerch. Maio floret. ⊙

585. A. *rostratum. Marsch. Fl. taur Sup. n.* 1272.* *D. C. Syst. univ.* 2. *p.* 313. — Copiosum in lazaret Odessæ. Julio florens. ⊙

586. A. *incanum. Sp. pl.* 908. *Marsch. Fl. taur. n.* 1271. *Berteroa incana. D. C. Syst. un.* 2. *p.* 291. — Circà Theodosiam in collibus herbidis. ♂

587. A. *obliquum. Sibth. n.* 1509. *Berteroa obliqua. D. C. Syst. univ.* 2. *p.* 292.

Lunaria leucoii-folio, siliquâ oblongâ minori. *Tourn. Inst.* 218. *Herb. Vaillant.* — In nemoribus Bulgariæ copiosè; julio floret. ♄

588. A. *orbiculatum. Berteroa orbiculata. D. C. Syst. univ.* 2. *p.* 293.

A. caule basi suffruticoso ramoso diffuso, foliis radicalibus oblongis subsinuatis, caulinis sessilibus lanceolatis integris, cunctis subincanis; floribus minimis, siliculis compressis ferè orbiculatis stylo filiformi superatis.

In arenosis sinûs Singitici, ad canalem Xerxis hanc inveni speciem. Augusto florucrat. ♄

589. BISCUTELLA *Columnæ. D. C. Syst. univ.* 2. *p.* 412. B. *didyma b. Sp. pl.* 911. B. *apula. Sibth. n.* 1522.

Thlaspidium apulum spicatum. *Tourn. Inst.* 215. *Herb. Tourn.*—In aridis insularum Melitæ et Meli copiosè; aprili floret. ⊙

590. ISATIS *tinctoria. Sp. pl.* 936. *Marsch. Fl. taur. n.* 1237.—In lazaret Odessæ. Julio florens. ♂

II. SILIQUOSA.

591. SISYMBRIUM *Orientale. Sp. pl.* 921. *Sibth. n.* 1540. S. *Columnæ. Var. e. D. C. Syst. univ.* 2. *p.* 469.

Erysimum angusti-folium majus procerius et minùs hirsutum. Ex insulâ Therâ. *Herb. Tourn.*

Folia angustissima basi pinnatifida, caulis supernè glaber, flores parvi pallidè sulphurei, siliquæ saltèm 3 pollicares patentes incurvæ, pedunculi breves crassi.

In petrosis maritimis insularum Cimoli et Meli frequenter: Aprili floret. ⊙

592. S. *Loeselii. Marsch. Fl. taur. n.* 1294.

S. caule erecto supernè ramoso, retrorsùm hispido, foliis runcinatis acutis hirtis, siliquis patentibus.

Flores intensè lutei.—In herbidis Theodosiæ minimè rarum. Maio florens. ⊙

593. S. *Columnæ. Wild. Sp.* 3. *p.* 503. *Marsch. Fl. taur. n.* 1293. *D. C. Syst. univ. p.* 469.

Huic herbæ pars inferior villoso-tomentosa, superior glabrata; flores magni pallidè sulphurei. — In collibus Tauriæ cum præcedente passim reperitur. ⊙

594. S. *Pannonicum. Wild. Sp.* 3. *p.* 502. *Marsch.*

Fl. taur. n. 1291. *D. C. Syst. univ.* 2. *p.* 470.—In pascuis Tauriæ copiosè, circà oppidum Kerch. Maio florens. ⊙

595. S. *sophia. Sp. pl.* 920. *Marsch. Fl. taur. n.* 1290. Circà Theodosiam frequentissimè. ⊙

596. S. *junceum. Wild. Sp.* 3. *p.* 513. *Marsch. Fl. taur. n.* 1295. *D. C. Syst. univ.* 2. *p.* 462.—Passim in herbidis Tauriæ, in insulà Berezen, circâ Kerch et Odessam. Junio floret. ⊙

597. S. *sylvestre. Sp. pl.* 916. *Sibth. n.* 1532. *Marsch. Fl. taur. n.* 1284. — In ruderatis circà Trapezum. ♃

598. ERYSIMUM *alliaria. Sp. pl.* 922. *Sibth. n.* 1545. *Alliaria officinalis. D. C. Syst. un.* 2. *p.* 489. — Ad sepes, propè Byzantium copiosè. ♂

599. E. *hieraci-folium. Sp. pl.* 923. *Sibth. n.* 1547. *D. C. Syst. un.* 2. *p.* 497. *var. b.*

Caulis ramosissimus, folia ferè crispa, siliquæ patentes.

In summis montibus insulæ Coi, ad altitudinem 3-400 hexapodum; maio florens ♂

600. E. *diffusum. Wild. sp.* 3. *p.* 512. *Marsch. Fl. taur. n.* 1301.—In insulâ Berezen ad Borysthenem copiosè crescit. Julio. ♂

601. CHEIRANTHUS *cuspidatus; Wild. Sp.* 3. *p* 525. *Marsch. Fl. taur. n.* 1308. *Erysimum cuspidatum. D. C. Syst. un.* 2. *p.* 493.—In collibus herbidis, circà Kerch et Sevastopolem. Maio florens. ♂

602. C. *tricuspidatus. Sp. pl.* 926. *Sibth. n.* 1562. — Ad littora arenosa maris, in insulis Melo et Cimolo. ⊙

603. C. *sinuatus*. *Sp. pl.* 926. *Sibth. n.* 1563.—In rupibus maritimis scopuli St.-Istad, propè Cimolum. Maio floret. ♂

604. C. *cheiri*. *Sp. pl.* 924. *Sibth. n.* 1549.

Flos magnus intensè luteus, caulis foliaque glaberrima. — In scopulo Raphthi copiosè, ad littus Atticum. ☿

605. HESPERIS *incrassata*. *Maloomia incrassata*. *D. C. Syst. univ.* 2. *p.* 441.

H. caule basi ramoso suberecto, foliis ovalibus petiolatis, superioribus oblongis, pube adpressâ bipartitâ vix conspicuâ, pedicellis calyce brevioribus post anthesin valdè incrassatis, siliquis subpubescentibus, stylo acutissimo superante.

Folia subcarnosa, siliquæ crassæ strictæ, flos pallidè violaceus. — Frequens in rupibus maritimis insulæ Cimoli. Maio floret. ⊙

606. H. *tristis*. *Sp. pl.* 927. *Marsch. Fl. taur. n.* 1314. *D. C. Syst. un.* 2. *p.* 447.—In herbidis Tauriæ, circà Kerch. Maio floret. ♂

607. ARABIS *recta*. *Wild. Sp.* 3. *p.* 536. *Marsch. Fl. taur. n.* 1321. *Arabis auriculata var. b. D. C. Syst. univ.* 2. *p.* 220.—In lazaret Theodosiæ. Maio florens. ⊙

608. BRASSICA *elongata*. *Wild. Sp.* 3. *p.* 552. *Marsch. Fl. taur. n.* 1327. *D. C. Syst. un.* 2. *p.* 604. —In collibus circà Odessam. Julio florens. ♂

609. SINAPIS *arvensis*. *Sp. pl.* 933. *Sibth. n.* 1577. *D. C. Syst. un.* 2. *p.* 615.—In arvis insulæ Scyri ⊙

609. (*bis*) RAPHANUS *maritimus*. *D. C. Fl. fr. Sup. n.* 588. *Syst. un.* 2. *p.* 668.—In arenosis Colchidis, ad arcem Soukoum-Kale. Junio floret.

XVI. MONADELPHIA.

I. PENTANDRIA.

610. ERODIUM *cicutarium*. *Marsch. Fl. taur.* n. 1337. *Geranium cicutarium*. *Sp. pl.* 951.—In incultis commune, circà Theodosiam.

II. DECANDRIA.

611. GERANIUM *radicatum*. *Wild. Sp.* 3. *p.* 698. *Marsch. Fl. taur.* n. 1341. *D. C. Fl. fr. Sup.* n. 4542 (*a*).—Crescit in pascuis Tauriæ, circà Kerch valdè copiosum. Maio floret. ♃

612. G. *asphodeloïdes*. *Wild. Sp.* 3. *p.* 704 *Sibth.* n. 1605.

G. Constantinopolitanum, columbinum, flore maximo, asphodeli radice. *Herb. Tourn.* — Frequens ad scopes Asiæ minoris, propè Byzantium. Aprili floret. ♃

III. POLYANDRIA.

613. ALTHÆA *cannabina*. *Sp. pl.* 966. *Sibth.* n. 1614. — In campis incultis Bulgariæ. ♃

614. A. *rosea*. *Wild. Sp.* 3. *p.* 773. *Alcea rosea*. *Sp. pl.* 966. *Sibth.* n. 1616.—Passim in nemoribus Bulgariæ, ad pagum Ineada. ♃

615. A. *ficifolia*. *Sp. pl.* 967. *Sibth.* n. 1617. *Marsch. Fl. taur.* n. 1362.—In plantâ nostrâ folia tantùm lobata nequaquàm palmata.—In collibus circà Trapezum rarius. Junio floret. ♂

616. LAVATERA *Thuringiaca*. *Sp. pl.* 973. *Sibth.*

n. 1628. *Marsch. Fl. taur. n.* 1366.—Haud rarè reperitur in collibus, propè Odessam. Julio florens. ♃

617. L. *punctata. Wild. Sp.* 3. *p.* 797. *Sibth. n.* 1630.—Copiosissimè ad sepes, in insulis Coo, Samo, Lesbo, etc. Maio, junio floret. ☉

618. L. *unguiculata. Hort. Par. Poiret. Ency. Sup. t.* 3. *p.* 309.

Althæa bryoniæ-folio. C. B. *Herb. Tourn.*—In collibus Sami; junio floret. ♄

619. HIBISCUS *vesicarius. Wild. Sp.* 3. *p.* 832.

Ketmia vesicaria, vulgaris. *Herb. Tourn.*—In insulâ Lesbo inter Gossypia. Junio florens. ☉

XVII. DIADELPHIA.

I. OCTANDRIA.

620. POLYGALA *major. Wild. Sp.* 3. *p.* 874. *Sibth. n.* 1040. *Buxb. Cent.* 3. *p.* 40. *t.* 70. *f.* 1.

P. Pontica, lini-folia, magno flore purpureo vel albo. *Gundelsheimer in Herb. Tourn.*—In collibus herbidis, circà Trapezum minimè rara. Junio floret. ♃

621. P. *vulgaris. Sp. pl.* 986. *Sibth. n.* 1639. —In umbrosis insulæ Meli, propè monasteria. ♃

622. P. *amara. Sp. pl.* 987. *D. C. Fl. fr. n.* 2383. —Propè Byzantium, in monte Bougourlou. Maio floret. ♃

II. DECANDRIA.

623. SPARTIUM *villosum. Wild. Sp.* 3. *p.* 935. *Sibth. n.* 1646. S. *lanigerum. Desf. Atl.* 2. *p.* 135. *Cytisus lanigerus. D. C. Fl. fr. n.* 3823.

Cytisus spinosus Creticus, siliquâ villis longissimis et incanis obductâ. *Herb. Tourn.* — Frequens in collibus siccis insulæ Meli. Aprili florens. ♄

624 GENISTA *Lobelii. D. C. Fl. fr.* 3816.

Genista spartium spinosum alterum, aphyllum, tribus aculeis semper junctis; floribus luteis. C. B. *Herb. Tourn.*

Caulis 2-3 pedalis ramosissimus intricatus diffusus; calyces corollæque pilis sericeis obductæ. — Cùm præcedente ubique reperitur in apricis insulæ Meli. Maio floret. ♄

625. ONONIS *altissima. Lam. Ency.* 1. *p.* 506. O. *hircina. Marsch. Fl. taur. n.* 1380. *Wild. Sp.* 3. *p.* 989.—Circà Odessam nequaquàm rara, in udis. Julio floret. ♃

626. O. *serrata. Vahl. Symb.* 1. *p.* 52. *Persoon. Syn.* 2. *p.* 290.

Multò minùs villosa quàm *O. villosissima. Desf.* cui omninò affinis.

In arenis maritimis insulæ Meli copiosissima. Aprili florens. ♃

627. O. *ramosissima. Desf. Fl. atl.* 2. *p.* 142. *Persoon. Syn.* 2. *p.* 291.—In insulâ Lero ad margines viarum, passim reperitur. Maio floret. ♃

628. O. *viscosa. Sp. pl.* 1009. *Sibth. n.* 1659. In arenosis insulæ Meli. ☉

629. O. *mitissima. Sp. pl.* 1007. *Sibth. n.* 1655. Frequens in collibus insulæ Coi. Maio floret. ☉

630. O. *variegata. Sp. pl.* 1008. *D. C. Fl. fr. n.* 3840. O. *aphylla. Lam. Ency.* 2. *p.* 509.—In arenosis insulæ Coi vulgaris. Maio floret. ☉

631. LUPINUS *angusti-folius. Sp. pl.* 1005. *Sibth. n.* 1669. Abundat in insulâ Melo propè veterem urbem, necnon in scopulo novo Caminí, ad latera vulcani. Aprili floret. ℞

632. L. *albus. Sp. pl.* 1015. *D. C. Fl. fr. n.* 3829. Frequens in nemoribus, circà Byzantium. Florens maio. ☉

633. L. *varius. Sp. pl.* 1015. L. *semi-verticillatus. Lam. Ency.* 4. *p.* 623. — Crescit in nemorosis insulæ Meli, propè monasterium. ☉

634. ANTHYLLIS *Hermanniæ. Sp. pl.* 1014. *Sibth. n.* 1666.

Barba-jovis Cretica, linariæ folio, flore luteo parvo. *Herb. Tourn.*

In collibus siccis insulæ Leri atque versùs montem Athonem copiosissimè. Junio floret. ℞

635. OROBUS *croceus. Desf. Cor. p.* 85. *t.* 63.

O. Cappadocicus, latifolius villosus, flore croceo. *Gundelsheimer in Herb. Tourn.*

Caulis ramosus, 4-5 pedalis, fructus lati plani breviter mucronati. — In nemoribus cum *Azaleâ*, propè Trapezum. Junio medio floruerat. ℞

636. O. *hirsutus. Sp. pl.* 1027. *Sibth. n.* 1676. *Marsch. Fl. taur. n.* 1385. O. *Laxiflorus. Desf. Cor. p.* 83. *t.* 65. *Buxb. Cent.* 3. *p.* 22. *t.* 51.

O. Creticus, latifolius, incanus. *Tour. Cor.* 26. *Herb. Tourn.* — Propè Byzantium in monte Bougourlou copiosè nascitur. Maio florens. ℞

637. O. *digitatus. Marsch. Fl. taur. n.* 1389. O. *sessili-folius Sibth. n.* 1680. O. *Pyrenaicus. Pallas Ind. taur.*

O. Ponticus, foliis angustissimis, costæ brevissimæ innascentibus. *Herb. Tourn.*—Cum præcedente in monte Bougourlou nec rarius. ♃

638. LATHYRUS *tenui-folius. Desf atl.* 2. *p.* 160. *Wild. Sp.* 3. *p.* 1085. L. *alatus*? *Sibth. n.* 1689.—Inter segetes Meli non infrequens. Maio floret.

639. L. *rotundi-folius. Marsch. Fl. taur. n.* 1397. L. Armenius, rotundifolius, flore rubro. *Gundelsheimer. in Herb. Tourn.*—Propè Byzantium in nemoribus haud rarus. Maio floret. ♃

640. L. *sphæricus. D. C. Fl. fr. n.* 3988. L. *angulatus. Sibth. n.* 1688. L. *coccineus. Allioni. Ped.* 1. *p.* 330.—In arvis insulæ Meli passim invenitur. ☉

641. L. *cicera. Sp. pl.* 1030. *Sibth. n.* 1685.—Inter segetes insulæ Meli, etiàm circà Byzantium. ☉

642. L. *tuberosus. Sp. pl. n.* 1033. *Marsch. Fl. taur. n.* 1396.—In collibus herbidis circà Odessam. Julio florens. ♃

643. PISUM *sativum Sp. pl.* 1026. *Sibth. n.* 1671. —In arvis Byzantinis ubique reperitur. ☉

644. VICIA *Bythynica. Sp. pl.* 1038. *Sibth. n.* 1714.—In incultis insulæ Meli. Maio floret. ☉

645. V. *microphylla.* Caule debili basi ramoso diffuso, foliolis 8-10 ovatis subpetiolatis minimis mucronatis, pedunculis strictis foliis duplò triplòve longioribus 4-6 flores gestantibus, floribus majusculis pallidis, leguminibus compressis glabris 5-7. spermis.

Stipulæ minimæ semi-sagittatæ : pedunculi rigidi; flores pallidè violacei seu albi calyce saltem triplò longiores, foliola lineam lata duoque lineas longa. Caulis 2-3 pedalis suprà *poteria spinosa* seu *genistas* scandens.

In collibus apricis Meli, circà monasterium copiosè. Aprili floret. ♃

646. V. *repens*. Caule diffuso basi ramoso humifuso, foliolis subsenis alternis angustissimis acutis, floribus axillaribus solitariis ferè sessilibus, stipulis vix conspicuis, leguminibus compressis glabris tetraspermis.

Pedunculi vix sesquilineam longi stipulâ brevissimâ sub flore donati; flores pallidi, pallidè pupurei calyce duplò triplòve longiores. Semina proeminentia.—In siccis insulæ Meli, aprili floret. ♂

647. V. *tenuifolia*. *D. C. Fl. fr. Sup. n.* 4013 (*a*). *Marsch. Fl. taur. n.* 1406.—In collibus circà Trapezum et Odessam frequens. Julio floret. ♃

648. V. *cracca*. *Sp. pl.* 1035. *Marsch. Fl. taur. n.* 1405. *Sibth. n.* 1702.—Propè Byzantium et Trapezum minimè rara. Junio floret. ♃

649. V. *onobrychioïdes*. *Sp. pl.* 1036. *Sibth. n.* 1703.

Stipulas tantùm semi-sagittatas nunquàm basi dentatas vidi. — In udis insulæ Meli rariùs. Aprili floret. ♃

650. V. *cassubica*. *Sp. pl.* 1035. *Marsch. Fl. taur. n.* 1403. — In nemoribus circà Trapezum. Junio floret. ♃

651. V. *Pannonica*. *Wild. Sp.* 3. *p.* 1107. *Marsch. Fl. taur. n.* 1412.—In herbidis Tauriæ copiosè, circà Theodosiam. Maio floret. ☉

652. V. *Biebersteinii*. *Marsch. Fl. taur. Sup. n.* 1411. —Propè Theodosiam, in pascuis frequens. Maio floret. ♃

653. V. *sepium*. *Sp. pl.* 1038. *Marsch. Fl. taur.*

n. 1414.—In umbrosis Colchidis passim invenitur, ad arcem Soukoum. ♃

654. ERVUM *hirsutum. Sp. pl.* 1039. *Marsch. Fl. taur. n.* 1418. — In collibus herbidis, circà Kerch. ☉

655. CYTISUS *lotoïdes. Wild. Sp.* 3. *p.* 1127.

C. *pauciflorus. Marsch. Fl. taur. n.* 1423.

C. Orientalis humifusus, facie trifolii pratensis. *Tourn. Cor.* 44. *Icon. Aubriet. Herb. Tourn.*

Propè Byzantium in monte Bougourlou, in collibus circà Trapezum ubique crescit. Maio, Junio floret. ♃

656. C. *Ponticus. Wild. Sp.* 3. *p.* 1120. *Poiret. Ency. Sup. n.* 22.

C. Ponticus humi-fusus, magno flore ex luteo purpurascente. *Tourn. Cor.* 44. *Herb. Tourn.* — Frequens in monte Bougourlou. Maio florens. ♃

657. COLUTEA *arborescens. Sp. pl.* 1045. *Sibth. n.* 1727.—In montosis insulæ Scopeli copiosè. ♄

658. GLYCYRRHIZA *glabra. Sp. pl.* 1046. *Sibth. n.* 1729. — Abundat ad ripas Imbrasi, ad columnam veteris Heræi. Junio florens. ♄

659. CORONILLA *Cappadocica. Wild. Sp.* 3. *p.* 1154. C. *Iberica. Marsch. Fl. taur. Sup. n.* 1433. *Buxb. C.* 2. *t.* 40. *f.* 1.

C. Orientalis herbacea flore magno luteo. *Tourn. Cor.* 44. *Herb. Tourn. Icon. Aubriet.* — Circà Trapezum in collibus graminosis minimè rara. Junio floret. ♃

660. C. *varia. Sp. pl.* 1048. *Sibth. n.* 1734.

Hìc fortè *C. globosam* cum *C. variâ* confundo sed valdè dubium an duo species sint distinctæ.

Planta in Oriente communis tùm in Colchide ad Soukoum, tùm in Tauriâ ad Sevastopolem, etiàm circà Trapezum et Odessam. Maio, junio floret. ♃

661. C. *Cretica. Sp. pl.* 1048. *Sibth. n.* 1735.—In nostrâ plantâ legumina incurva videntur. — In collibus elatis insulæ Coi. Maio floret. ⊙

662. C. *securidaca. Sp. pl.* 1048. *Sibth. n.* 1733. —Ad sepes, in insulâ Samo. Floret maio. ⊙

663. ORNITHOPUS *ebracteatus. D. C. Fl. fr. Sup. n.* 4039. *Lois. Fl. gall. p.* 467. —Ad sepes insulæ Meli, aprili floret. ⊙

664. O. *scorpioïdes. Sp. pl.* 1049. *Sibth. n.* 1738. —Frequens in arvis Meli. ⊙

665. HIPPOCREPIS *dicarpa. Marsch. Fl. taur. Sup. n.* 1440.*

H. leguminibus sæpiùs geminis; isthmis barbatis dorso ciliatis, pedunculis folio brevioribus.

Passìm in apricis insulæ Meli. ⊙

666. SCORPIURUS *lævigata. Sibth. n.* 1743.

S. pedunculis subtrifloris, leguminibus sulcatis contortuplicatis undique inermibus.

In arvis insulæ Astypalææ. Maio fructus gerit. ⊙

667. S. *subvillosa. Sp. pl.* 1050. *D. C. Fl. fr. n.* 4036. — Cum præcedente in segetibus reperitur. ⊙

668. HEDYSARUM *spinosissimum. Sp. pl.* 1058. *Sibth. n.* 1746.

Onobrychis clypeata aspera minor. C. B. *Herb. Tourn.* In arvis maritimis insulæ Meli copiosissimè. Aprili floret. ⊙

669. ONOBRYCHIS *æquidentata. Hedysarum æquidentatum. Sibth. n.* 1752.

O. Cretica, fructu cristato et aculeato, foliis viciæ *Herb. Tourn.*

O. *crista-galli* valdè affinis. Nostra differt pedunculis folio duplò vel triplò longioribus, aculeis dorsalibus latis uniformibus integris nunquàm dentatis, foliolis latioribus ferè ovatis; dentibus calycinis corollæ subæqualibus. —In collibus insulæ Meli copiosè. Aprili floret. ⊙

670. O. *sativa. D. C. Fl. fr. n.* 4055. *Hedysarum onobrychis. Sp. pl.* 1059. *Marsch. Fl. taur. n.* 1451. —Frequens in collibus herbidis, propè Odyssam. ♃

671. GALEGA *officinalis. Sp. pl.* 1062. *Marsch. Fl. taur. n.* 1455. — Abundat in pratis Colchidis, ad arcem Soukoum-Kale; junio floret. ♃

672. ASTRAGALUS *pilosus. Sp. pl.* 1065. *Marsch. Fl. taur. n.* 1462.—In herbidis Tauriæ passim reperitur, circà Kerch. Maio floret. ♃

673. A. *cicer. Sp. pl.* 1067. *Marsch. Fl. taur. n.* 1470.

A. hirsuta, reticaulis. J. B. *Herb. Tourn.*—In lazaret Odessæ; julio floret. ♃

674. A. *onobrychis. Sp. pl.* 1070. *Marsch. Fl. taur. n.* 1482. *Var. angustifolius. D. C. Astrag. p.* 124. *n.* 24.

In plantâ nostrâ folia angustissima acuta, caules erecti, pedunculi longissimi stricti, legumina cana villosa.— In herbidis Odessæ copiosissimè; julio floret.

675. A. *Bæticus. Sp. pl.* 1068. *Sibth. n.* 1762.—In arvis Meli, propè vetus theatrum, aprili floret. ⊙

676. A. *asper. Wild. Sp.* 3. *p.* 1271. *Marsch. Fl. taur. n.* 1466. — In herbidis Tauriæ, propè oppidum Kerch. Maio florens. ♃

677. A. *striatellus. Marsch. Fl. taur. n.* 1472.

A. caulescens diffusus glaber, foliolis cuneiformibus subemarginatis, pedunculis subtrifloris folio brevioribus, leguminibus ovato-oblongis tumidis deflexis glabris.

In pascuis Tauriæ, ad urbem Kerch. Maio floret. ☿

678. A. *diffusus. Wild. Sp.* 3. *p.* 1321. *Marsch. Fl. taur. n.* 1496.

Flores pallidè flavi.—In graminosis Tauriæ; ad oppidum Kerch, Maio floret. ☿

679. A. *pseudo-tragacantha. Marsch. Fl. taur. n.* 1499*. *A. aristatus. Sibth. n.* 1775.

A plantâ quam descripsit Cl. *Marschall* nostra differt foliolis ferè glabris acutis subspinosis, ab *A. aristato Lam.* magis tamen differt corollis ochroleucis confertis sessilibus et calycibus lanâ longâ et incanâ tectis.—Frequens in collibus circà Thessalonicam. ♄

680. A. *rotundi folius. Wild. Sp.* 3. *p.* 1317. *A. nummularius. Desf. atl.* 2. *p.* 182. *A. nummularioïdes. D. C. astrag. p.* 233. *Buxb. cent.* 3. *t.* 38. *f.* 1. —In apricis insulæ Meli ubique crescit. Aprili floret. ☿

681. A. *pentaglottis. L. mant.* 274. *D. C. astrag.* 92. *D. C. Fl. fr. n.*3963.—In collibus nemorosis insulæ Meli copiosè, aprili floret.

682. A. *nummularius. Wild. Sp.* 3. *p.* 1321? *Marsch. Fl. taur. n.* 1499?

A. subacaulis, foliolis ovatis decem-jugis vix pubescentibus apice emarginatis, scapis brevissimis pauciforis, bracteis minimis.

Flores magni ochroleuci, calyces subpilosi albidi. Legumina non cognosco.—In graminosis; circà Trapezum. Junio florens. ☿

683. MELILOTUS *cærulea. Trifolium. m. cærulea. Sp. pl.* 1077. T. *cæruleum. Marsch. Fl. taur. n.* 1505. — In herbidis, circà Odessam. Julio florens. ⊙

684. M. *Messanensis. D. C. Fl. fr. n,* 3898. *Trifolium messanense. L. mant.* 275. *Sibth. n.* 1781.—In paludosis maritimis insularum Melitæ et Scyri. Aprili jàm fructus gerit.

685. M. *leucantha. D. C. Fl. fr. sup. n.* 3894 (a). *Merat. Fl. Par.* 2. *p.* 411. *Trifolium album. Loisel. Fl. gall.* 479. — In Lazaret Odessæ haud rara. Junio florens. ♂

686. M. *officinalis. D. C. Fl. fr. n.* 3894. *Trifolium.* M. *officinalis. Sp. pl.* 1078. *Marsch. Fl. taur. n.* 1506. — In umbrosis Colchidis, ad arcem Soukoum-Kale. Junio floret.

687. M. *sulcata. Desf. atl.* 2. *p.* 193. *Trifolium mauritanicum. Wild. Sp. pl. p.* 1354. *Sibth. n.* 1782. — In arvis insulæ Meli frequens. Aprili floret. ⊙

688. M. *Italica. D. C. Fl. fr. n.* 3895. *Desf. atl.* 2. *p* 192. *T. melilotus Italica. Sp, pl.* 1078.

Planta nostra à definitione discrepat foliolis apice serratis.

Vulgaris ad latera vulcani novæ Camini, propè Therami. Maio floret. ⊙

689. M. *Cretica. Desf. atl.* 2. *p.* 193. *Trifolium. M. Cretica. Sp. pl.* 1078. *Sibth. n.* 1786.— Communis in arvis maritimis insulæ Leri. Junio ineunte, fructus maturos gerebat. ⊙

690. TRIFOLIUM *purpureum. Loisel. Fl. gall.* 484. *tab.* 14. *D. C. Fl. fr. sup. n.* 3878 (a). — Fre-

quens ad sepes insularum Sami et Seyri, etiam in nemoribus Bulgariæ, propè Ineada. Junio floret. ⊙

691. T. *formosum.* Caule erecto villoso supernè ramoso, foliolis ovato-oblongis mucronatis, stipulis amplis strictis longè subulatis, spicis ovatis densis multifloris, calycibus cano-villosis, dentibus subæqualibus longissimis post anthesin subpatentibus.

Pulcherrima species. Caulis pedalis sesquipedalis-ve 4-6 spicas gerens. Foliola pubescentia unciam et ampliùs longa, 4 lineas lata. Spicæ nudæ densæ solitares terminales. Calyces villis albidis induti, dentes ciliati acuti 6 lineas saltèm longi. Flores calyce breviores pallidè incarnati.

In incultis insulæ Meli frequens, aprili floret. ⊙

692. T. *angusti-folium. Sp. pl.* 1083. *Sibth. n.* 1802.—In collibus circà Trapezum, junio florat. ⊙

693. T. *diffusum. Wild. Sp.* 3. *p.* 1365, *Marsch. Fl. taur. n.* 1513.—In herbidis propè Odessam, julio florens. ⊙

694. T. *vesiculosum. Loisel. Fl. gall.* 2. *p.* 185. *t.* 15. *D. C. Fl. fr. Sup. n.* 3886 (a). *T. turgidum. Marsch. Fl. taur. n.* 1527. *T. recurvum. Waldst. et Kit. rar. hung.* 2. *t.* 165. — In nemoribus Bulgariæ, propè pagum Ineada, junio floret. ⊙

695. T. *pauci-florum.* Caule humifuso villoso basi ramosissimo, petiolis longissimis, foliolis cuneatis apice valdè dilatatis sæpius emarginatis integris, spicis solitaribus seu geminis brevitèr pedicellatis paucifloris, calycibus villosis, dentibus setaceis corollâ brevioribus.

Caulis basi crassus ramosissimus, rami humifusi pedales, folia longè petiolata, stipulæ striatæ ciliatæ apice

subulatæ. Spicæ subquinque-floræ basi interdùm folio superno vaginatæ. Flores intensè purpurei calyce duplò longiores.

Abundat in campis Asiæ minoris propè Byzantium. Maio floret. ♂

Confer cum *T. rotundifolio. Sibth. n.* 1796.

696. T. *spumosum. Sp. pl.* 1085. *Sibth. n.* 1808. — Commune in arvis insulæ Meli. Aprili florens. ⊙

697. T. *ochroleucum. Wild. Sp.* 3. *p.* 1372. *Sibth. n.* 1800.—Passim in pratis circà Byzantium, necnon in collibus propè Trapezum. Floret maio, junio. ♃

698. T. *elegans. D. C. Fl. fr. Sup. n.* 3859. (*a*). *Loisel. not. p.* 108. T. *hybridum. Desf. atl.* 2. *p.* 295. T. *Vaillantii. Poiret. Ency.* 8. *p.* 2. *Sibth. n.* 1789. T. *ambiguum*? *Marsch. Fl. taur. n.* 1510.—In herbidis minimè rarum, circà Trapezum. Junio florens. ♃

699. T. *Michelianum. D. C. Fl. fr. Sup. n.* 3859 (*a*). *Loisel. not. p.* 109. *T. hybridum. Sp. pl.* 1079. *Sibth. n.* 1788.

T. Cappadocicum, altissimum, caule fistuloso, flore albo. *Herb. Tourn.*—Abundat inter segetes, circà Trapezum. Junio florens. ⊙

700. T. *tomentosum. Sp. pl.* 1086. *Sibth. n.* 1810. —Passim in incultis insulæ Meli. ⊙

701. T. *fragiferum. Sp. pl.* 1086. *Sibth. n.* 1811. —Cum præcedente, nec rariùs. ♃

702. T. *resupinatum. Sp. pl.* 1086. *Sibth. n.* 1809. —Circà Byzantium, copiosum ad sepes. Maio floret. ♂

703. T. *arvense. Sp. pl.* 1083. *Sibth. n.* 1803.—In cinerosis vulcani novæ Camini, propè Theram. Aprili floret. ⊙

704. T. *campestre. Smith. Fl. Brit.* 792. *D. C. Fl. fr. sup. n.* 3891. (*a*). T. *erectum. Poiret. Ency.* 8. *p.* 28. — In collibus propè Trapezum. Floret junio. ⊙

705. T. *Bocconii. D. C. Fl. fr. Sup. n.* 3885. (*a*). — Passim in apricis insulæ Meli. Aprili floret. ⊙

706. T. *scabrum. Sp. pl.* 1084. *Sibth. n.* 1806. — In collibus insulæ Meli haud rarum. Florens aprili. ⊙

707. T. *uniflorum. Sp. pl.* 1085. *Sibth. n.* 1807. Melilotus Cretica, humillima humifusa, flore albo magno. *Tourn. Cor.* 28. *Icon. Aubriet.*

Frequens in arenosis insularum Archipelagi, necnon in monte Bougourlou propè Byzantium. Maio floret. ♄

708. LOTUS *cytisoïdes. Sp. pl.* 1092. *D. C. Fl. fr. n.* 3935. — In arenis maritimis insulæ Meli. Aprili floret. ⊙

709. L. *corniculatus. Var. tenuifolius. Sp. pl.* 1092. *D. C. Fl fr. n.* 3936. — In herbidis circà Odessam. ♄

710. L. *Creticus. Sp. pl.* 1091. *Sibth. n.* 1822. — In arenosis insulæ Coi, propè urbem. Floret maio ♃

711. L. *tetragonolobus. Sp. pl.* 1089. *Sibth, n.* 1816. — Abundat intèr segetes insularum Melitæ et Meli. Floret aprili. ⊙

712. L. *aristatus. D. C. Fl. fr. Sup. n.* 3935 (*a*). L. *Coïmbrensis. Loisel. Fl. gall.* 488.—Passim in arvis insulæ Meli. Floret aprili. ⊙

713. L. *ornithopodioïdes. Sp. pl.* 1091. *Sibth. n.* 1821. — In collibus insulæ Meli. Aprili floret ♄

714. DORYCNIUM *latifolium. Wild. Sp.* 3. *p.* 1397. *Sibth. n.* 1828.

D. Ponticum, latifolium villosum. *Herb. Tourn.*

Passìm creseit in nemoribus, circà Trapezum. Junio floret. ♄

715. TRIGONELLA *monspeliaca. Sp. pl.* 1095. *Sibth. n.* 1833. — In collibus incultis Meli. Floret aprili. ☉

716. T. *corniculata. Sp. pl.* 1094. *Sibth. n.* 1829. Fænum-græcum sylvestre; meliloti facie. *Tourn. Cor.* 28. *Gundelsheimer. in Herb. Tourn.*

In graminosis insularum Meli et Astypalææ. Florens maio. ◎

717. MEDICAGO *glutinosa. Wild. Sp.* 3. *p.* 1406. *Marsch. Fl. taur. n.* 1545. —In collibus circà Theodosiam et Odessam. Junio floret. ♃

718. M. *circinnata. Sp. pl.* 1096. *Sibth. n.* 1837. M. vulnerariæ facie, Cretica. *Herb. Tourn.*

Passìm in montosis insulæ Meli, propè Monasterium. Aprili floret. ◎

719. M. *coronata. Wild. Sp.* 3. *p.* 1413. *Sibth. n.* 1844.—In petrosis insulæ Astypalææ; maio ineunte fructus gerens. ◎

720. M. *intertexta. Wild. Sp.* 3. *p.* 1411. *D. C. Fl. fr. n.* 3915.—In arenosis insulæ Sami. Junio ineunte fructus jàm maturi sunt. ☉

721. M. *tuberculata. Wild. Sp.* 3. *p.* 1410. *D. C. Fl. fr. n.* 3910. — In collibus insulæ Meli : aprili floret. ☉

722. M. *tribuloïdes. Lam. Ency.* 3. *p.* 635. *Wild. Sp.* 3. *p.* 1416.

M. Cretica, parvo fructu, aculeis sursùm et deorsùm tendentibus. *Tourn. Cor.* 28. *Herb. Vaillant.* — Passìm in arvis insulæ Meli. Aprili floret. ☉

723. M. *rugosa*. *Lam. Ency.* 3. *p.* 632. *D. C. Fl. fr. Sup. n.* 3907. (a) M. *elegans*. *Wild. Sp.* 3. *p.* 1408. —In arvis insulæ Meli haud rara. Aprili floret. ☉

724. M. *maculata*. *Wild. Sp.* 3. *p.* 1412. *Sibth. n.* 1843.—Propè Byzantium, ad sepes. ☉

725. M. *marina*. *Sp. pl.* 1097. *Sibth. n.* 1846. — Ad littora maris in insulâ Melo, haud rarè.

XVIII. SYNGENESIA.

I. POLYGAMIA ÆQUALIS.

726. GEROPOGON *hirsutum*. *Sp. pl.* 1109. *Sibth. n.* 1867. *Tragopogon hirsutum*. *D. C. Fl. fr. n.* 2990. — In apricis insulæ Meli, propè tumulos. Aprili floret. ♂

727. TRAGOPOGON *pratense*. *Sp. pl.* 1109. *Marsch. Fl. taur. n.* 1562.—Circà Theodosiam, in herbidis minimè rarum. ♂

728. UROSPERMUM *picroïdes*. *Desf. Cat.* 90. *D. C. Fl. fr. n.* 2986. *Tragopogon picroïdes*. *Sp. pl.* 1110. *Arnopogon picroïdes*. *Sibth. n.* 1874.—In incultis insulæ Astypalææ. ☉

729. SCORZONERA *araneosa*. *Sibth. n.* 1880? S. *lanata*? *Marsch. Fl. taur. n.* 1574.

S. caule unifloro basi folioso sèu nudo, foliis linearibus recurvis caule longioribus calyceque basi piloso-canis, radice tuberosâ maximâ.

Affinis *S. tuberosæ*. *Pallas*, sed distinguitur flore duplò majore, foliis longioribus basi cano-tomentosis calyceque.

Passim in saxosis insulæ Meli, necnon in monte Bougourlou circà Byzantium. Aprili florens. ɣ

730. S. *calcitrapi-folia. Vahl. Symb.* 2. *p.* 87. *Wild. Sp.* 3. *p.* 1505. *Sibth. n.* 1884.

S. Orientalis, foliis calcitrapæ, flore flavescente. *Tourn. Cor.* 36. *Icon. Aubriet.*

Valdè frequens in collibus aridis insulæ Meli. Aprili floret. ☼

731. S. *laciniata. Sp. pl.* 114. *Marsch. Fl. taur. n.* 1576.—In pascuis Tauriæ, propè Theodosiam. Maio floret. ☼

732. S. *gramini-folia. Sp. pl.* 1112. *Sibth. n.* 1879. *Buxbaum. Cent.* 2. *p.* 26. *t.* 21.—Ad rivulos in insulâ Samo. Junio florens. ☼

733. S. *elongata. Wild. Sp.* 3. *p.* 1508. *Sibth. n.* 1886. *Catananche Græca. Sp. pl.* 1142. S. *aspera*? *Desf. Annal. Mus. v.* 1. *p.* 133. *t.* 9.

Scorzonera saxatilis et maritima, foliis variè laciniatis. Insularum Cycladum. *Gundelsheimer in Herb. Tourn.*

In arenosis insulæ Meli frequentissimè. Vere floret. ☼

734. SONCHUS *tataricus. Wild. Sp.* 3. *p.* 1522. *Marsch. Fl. taur. n.* 1582.

Var. a. foliis runcinatis, floribus paniculatis sparsis; crescit in lazaret Theodosiæ et junio floret. ☼

Var. b. foliis ferè integris tantùm sinuatis, floribus numerosis confertis subcorymbosis ad *S. Sibiricum L.* accedit.—Hæc passim reperitur in herbidis, circà Odessam. Julio florens. ☼

735. LACTUCA *Cretica. Desf. Cor. Tourn. p.* 48. *t.* 37.

Lactuca Cretica, sonchifolio, laciniato, pulchro flo-

re. *Tourn. Cor.* 35. *Gundelsheimer in Herb. Tourn. Icon. Aubriet.*

In aridis insularum Meli, Theræ, Astypalææ, copiosè crescit. Aprili floret.

736. CHONDRILLA *ramosissima. Sibth. n.* 1900? *non Prenanthes ramosissima. Allioni.*

C. caule ramosissimo patulo ramis divaricatis strictis ferè nudis sulcatis, angulis spinosis, foliis omnibus dentato-spinosis, floribus minimis cylindricis, calycibus pubescentibus aculeis flavis adspersis.

Flores lutei, pappi pilosi albidi.

A *P. hispidâ. Pallas.* cui proxima differt: caule patulo, ramis profundè sulcatis ferè angulatis hispidis crassioribus, calycibusque aculeis flavis instructis.

Passim in arvis circà Athenas. ♃

737. LEONTODON *lævigatus. Wild. Sp.* 3. *p.* 1546. *Taraxacum lævigatum. D.C. Fl. fr. Supp. n.* 2952. (a) In pratis Colchidis, ad arcem Soukoum-Kale. ♆

738. HYOSERIS *scabra. Sp. pl.* 1138. *Sibth. n.* 1947.—In siccis insulæ Melitæ. Aprili floret. ☉

739. H. *hedypnois. Sp. pl.* 1138. *Hedypnois Monspeliensis. Sibth. n.* 1948.—In incultis Melitæ. Aprili. ☉

740. H. *Cretica. Sp. pl.* 1139? *Sibth. n.* 1950?

In plantâ nostrâ calyces verò glabri. In arvis insulæ Meli. Aprili. ☉

741. PICRIS *hieracioïdes. Sp. pl.* 1115. *Marsch. Fl. taur. n.* 1602. — In parvâ insulâ Berezen, propè Borysthenem. ♃

742. HIERACIUM *echioïdes. Wild. Sp.* 3. *p.* 1587. *Marsch. Fl. taur. n.* 1611.—Frequens in lazaret Odessæ. Julio floret. ♃

743. H. *collinum. D. C. Fl. fr. Sup. n.* 2915. (a) H. *cymosum. Wild. Sp.* 3. *p.* 1566. H. *auricula. Var. b. Marsch. Fl. taur. Sup. n.* 1607.—In collibus graminosis, circà Trapezum. Junio florens. ♃

744. H. *foliosum. Wild. Sp.* 3. *p.* 1589. *Marsch. Fl. taur. n.* 1614.—Passim in lazaret Odessæ. Florens julio. ♃

745. CREPIS *nemausensis. Wild. Sp.* 3. *p.* 1592. *Sibth. n.* 1615. *Hieracium sanctum. Sp. pl.* 1127.—In herbidis Tauriæ, circà Theodosiam haud rarè. ☉

746. C. *montana.* Caule erecto basi folioso supernè ferè nudo multifloro, foliis radicalibus longissimis pinnatifidis, lobis ovatis latis integris, extimo subcordato apice rotundato, floribus magnis paucis, squamis calycinis pubescentibus margine membranaceis.

Affinis præcedenti; satis tamen differt radice perenni, foliis radicalibus amplis pinnatifidis, floribus quadruplò majoribus.—Frequens in montibus insulæ Coi. Maio floret. ♃

747. C. *hispida. Wild. Sp.* 3. *p.* 1601. *Marsch. Fl. taur. n.* 1624. *Barckausia setosa. D. C. Fl. fr. n.* 2951.—In pascuis Odessæ haud rara. Floret maio. ♂

748. C. *vesicaria. Sp. pl.* 1132. (a) *Wild. Sp.* 3. *p.* 1594. *Sibth. n.* 1928.

Hieracium Creticum, endiviæ-folio. *Tourn. Cor.* 35. *Gundelsheimer in Herb. Tourn.*

Circà Byzantium ad sepes copiosè. Maio floret. ♃

749. C. *angusti-folia.* Caule erecto scabro sulcato supernè ramoso, foliis inferioribus sinuatis seu pinnatifidis, caulinis amplexicaulibus longè et acutè sagittatis dentatis angustissimis, summis linearibus integris, floribus nu-

merosis paniculatis, pedunculis calycibusque nigricantibus hispidis, pappo piloso sessili.

Passim in pascuis Tauriæ, circà urbem Kerch. Floret maio. ⊙

750. C. *Dioscoridis*. *Sp. pl.* 1133. *Sibth. n.* 1939. Ad latus vulcani novæ Camini, propè Theram. Floret maio. ○

751. C. *parvi-flora*. *Desf. Cat. p.* 88. *Persoon. Syn.* 2. *p.* 376.—In arvis insulæ Astypalææ; florens maio. ⊙

752. C. *ramosissima*. Caule erecto scabro supernè ramosissimo, foliis caulinis scabris auriculatis linearibus longis, pedunculis multotiès dichotomis sub flore vix pubescentibus, floribus minimis numerosissimis, squamis calycinis dorso ciliatis, pappo piloso sessili.

C. *angusti-foliæ* proxima; sed discernitur floribus multò magis numerosis et duplò minoribus, foliis angustioribus, necnon pedunculis calycibusque tantùm hirtis nequaquàm nigricantibus.

In pascuis insulæ Berezen, antè fluvium Borysthenem. Julio florens. ⊙

753. C. *fuliginosa*. *Sibth. n.* 1947?

C. caule patulo hispido basi ramoso, ramis dichotomis paucifloris, floribus parvis plerumque solitaribus, foliis pilosis infernis lyratis seu acutè dentatis, summis amplexicaulibus basi sagittatis subintegris, calycibus atratis villosis vix calyculatis.

Planta interdùm caule erecto simplici atque glabriusculo. Tùm folia caulina dentata seu pinnatifida.

Ad sepes insulæ Meli ubique reperitur. Aprili floret. ⊙

754. C. *fœtida*. *Sp. pl.* 1133. *Sibth. n.* 1931. *Barc-*

kausia fœtida. D. C. Fl. fr. n. 2948. — Tùm in summis montibus insulæ Coi ; tùm in arvis Astypalææ copiosè. Florens maio. ☉

755. C. *ambigua. D. C. Fl. fr. n.* 2945. *C. altissima. Balbis. Cat. Hort. taur. p.* 15. — In incultis insulæ Coi nequaquàm rara. Floret maio. ♂

756. ANDRYALA *integri-folia. Sp. pl.* 1136. *D. C. Fl. fr. n.* 2938. A. *dentata. Sibth. n.* 1944. — In summo vulcano novæ Camini, propè Theram. ♂

757. SERIOLA *urens. Sp. pl.* 1139. *Sibth. n.* 1953. S. *Cretensis. Bivon. Bernard. St. rar. Sic. man. 4. p.* 15. S. *Cretensis. Sp. pl.* 1139. — Ad margines viarum in insulâ Melitâ. Aprili floret. ☉

758. LAPSANA *grandiflora. Marsch. Fl. taur. Sup. n.* 1629.

Plantæ nostræ flores equidem duplò majores quàm in L. *vulgari*, pedunculi autem calycesque glaberrimi.

Ad sepes circà Trapezum copiosissimè. Junio floret. ☉

759. CICHORIUM *spinosum. Sp. pl.* 1143. *Sibth. n.* 1965.

C. spinosum Creticum. *Tourn. Inst.* 479. *Herb. Tourn.* — Ubique in arenosis insulæ Astypalææ. Maio floret. ♂

760. SCOLYMUS *maculatus. Sp. pl.* 1143. *Sibth. n.* 1966. — In saxosis insulæ Sami. ☉

761. CARTHAMUS *Tingitanus. Sp. pl.* 1163.

Cnicus perennis, cæruleus, Tingitanus. Ex Cretâ. *Gundelsheimer in Herb. Tourn.* — In segetibus insulæ Astypalææ. Maio floret. ♄

762. C. *corymbosus. Sp. pl.* 1164. *Sibth. n.* 2013.

Brotera corymbosa. Wild. Sp. 3. *p.* 2399.—Frequens in arvis Sami, Coi, Lesbi etc. Julio, augusto floret. ♃

763. C. *dentatus. Wild. Sp.* 3. *p.* 1707. *Sibth. n.* 2009.

Cnicus atractylidis folio et facie, incanus patulus, flore purpurascente. *Tourn. Cor.* 33. *Herb. Tourn. Icon. Aubriet.*

In incultis insulæ Scyri copiosè crescit. Julio floret. ⊙

764. C. *leucocaulos. Sibth. n.* 2011.

C. caule nitido glaberrimo simplici supernè ramoso, squamis calycinis glabris longis dentato-spinosis, foliis uniformibus semi-amplexicaulibus pinnatifido-dentatis spinosis recurvis.

Flores pallidè violacei. Cum præcedente in insulâ Scyro. Julio floret. ♃

765. CARLINA *lanata. Sp. pl.* 1160. *Sibth. n.* 2004. — In apricis insulæ Astypalææ copiosè reperitur. ⊙

766. ATRACTYLIS *cancellata. Sp. pl.* 1162. *Sibth. n.* 2008.

Cnicus exiguus, capite cancellato, semine tomentoso. C. B. *Herb. Tourn.*

In aridis insulæ Astypalææ passim crescit. Maio floret.

767. A *gummifera. Sp. pl.* 1161. *Sibth. n.* 2007. Cnicus carlinæfolio acaulos gummifer aculeatus. *Tour. Cor.* 33. *Icon. Aubriet.*—In collibus insulæ Scyri minimè rara. Julio florens. ♃

768. LAPPA *tomentosa. Lam. Ency.* 1. *p.* 377. *Arctium bardana. Wild.* 3. *p.* 1632. *Marsch. Fl.*

taur. n. 1635. — Circà Odessam frequens, ad muros. ♂

769. ONOPORDUM *acanthium. Sp. pl.* 1158. *Marsch. Fl. taur. n.* 1672. — Circà Theodosiam frequens in incultis. ♂

770. O. *Illyricum. Sp. pl.* 1158. *Sibth. n.* 1995. — In collibus Astypalææ copiosum. ♂

771. O. *macrocanthum. Wild. Sp.* 3. *p.* 1687. *Sibth. n.* 1994. — In arvis incultis insulæ Psyræ, copiosissimè julio floret. ♂

772. O. *Græcum. Wild. Sp.* 3. *p.* 1688. *Sibth. n.* 1996. *Herb. Tourn.* — In campis maritimis insulæ Meli. Maio floret ⊙

773. O. *Tauricum. Wild. Sp.* 3. *p.* 1687. *Marsch. Fl. taur. n.* 1675. O. *elatum. Sibth. n.* 1998.

Carduus Creticus, acanthi folio viridi et glutinoso, flore purpurascente. *Tour. Cor.* 31. *Herb. Tourn.*

Valdè frequens in agris et cultis, circà Trapezum. Floret junio. ♂

774. O. *caulescens.* Caule erecto abbreviato folioso unifloro, foliis radicalibus amplissimis caule longioribus patentibus suprà viridibus subtùs cano-tomentosis, ad costam pinnatifidis, lobis approximatis laciniato-spinosis, squamis calycinis subglabris longè subulatis.

Omninò habitus *Cynaræ*, sed pappi simplices et decidui ad *Onopordum* referunt. Flores pupurei magni ferè ut in O. *Taurico.* Folia radicalia caule circitèr duplò longiora. Caulis tantùm pedalis, sæpè brevior.

In collibus saxosis insulæ Meli, copiosè circà Monasterium. Aprili floret ♄?

775. CARDUUS *acanthoïdes. Sp. pl.* 1150. *Sibth. n.* 1973.

Caulis 3-4 pedalis supernè ramosissimus. Flores magni longè pedunculati. Calyces glaberrimi, squamis canaliculatis latis apice spinosis, exterioribus reflexis. Forsitàn species distincta?

In ruderatis circà Theodosiam omninò frequens. Junio floret. ⊙

776. C. *Arabicus. Wild. Sp.* 3. *p.* 1646.—Passìm in cultis insulæ Melitæ. Aprili floret. ○

777. C. *uncinatus. Marsch. Fl. taur. Sup. n.* 1645.*

C. foliis decurrentibus sinuatis spinosis crispis, calycibus globosis arachnoideo-villosis, squamis subulatis reflexo-uncinatis, pedunculis tomentosis sub flore inermibus.

In herbidis copiosè, ad oppidum Kerch. Maio floret. ♂

778. C. *hamulosus. Wild. Sp.* 3. *p.* 1650. *Marsch. Fl. taur. n.* 1645. — Cum præcedente passìm occurrit in Tauriâ. ♂

779. C. *mollis. Sp. pl.* 1156. *Wild. Sp.* 3. *p.* 1661. *Sibth. n.* 1978. *Marsch. Fl. taur. n.* 1653. — Frequens in summis montibus insulæ Coi, etiàm in pascuis Tauriæ, circà oppidum Kerch. Floret maio. ♃

780. CIRSIUM *setosum. Marsch. Fl. taur. Sup. n.* 1671.** *Serratula setosa. Wild. Sp.* 3. *p.* 1643.— In cultis, ad vias frequens, propè Odessam. Julio floret. ♂

781. C. *incanum. Marsch. Fl. taur. Sup. n.* 1671.*** *Serratula ciliata. Wild. Sp.* 3. *p.* 1645.

irsium orientale, foliis laciniatis. *Tourn. Inst.* 445.

Vulgare tàm in herbidis Tauriæ, quàm in collibus circà Trapezum. Floret junio. ♃

782. C. *giganteum*. *Desf. Atl. 2. p. 345. t. 221. Persoon. Syn. 2. p. 388. Carduus ciliatus. Murray, Com. Goet. p. 35. t. 5.* — In sylvis Bulgariæ copiosissimè, ad pagum Ineada. Florens julio. ♃

783. C. *Syriacum*. *Carduus Syriacus. Sp. pl. 1153. Cnicus Syriacus. Sibth. n. 1992.* — Inter segetes insulæ Meli passim reperitur. Floret aprili. ☉

784. C. *Creticum*. *Carduus Creticus. Lam. Ency. n. 20. Cnicus leucocephalus. Wild. Sp. 3. p. 1668.*

C. foliis decurrentibus pinnatifidis supernè glabris; laciniis divaricatis spinosis; floribus parvis glomeratis, calycum squamis minutis subspinosis.

C. Creticum, altissimum, cardui lanceolati folio. *Tourn. Cor. 31. Herb. Tourn.*

Caulis 6-8 pedalis, rami erecti, aculei longi flavescentes. Flores purpurei. — Frequens in arenosis maritimis insulæ Sami, inter Heræum et ruinas veteris urbis. Junio florens. ♃

785. C. *polyanthos*. Caule erecto ramoso, foliis decurrentibus pinnatifidis subvillosis; laciniis divaricatis spinosis; floribus parvis numerosissimis confertis, calycum squamis minutis vix acutis.

Proximum præcedenti : sed differt caule ramosissimo, ramis patentibus, spinis foliorum et calycum brevioribus, floribus minoribus confertis non tantùm 2-3 sed etiam 6-16 et amplius simul.

Ad paludem Lernæ copiosissimè. Augusto floret. ♂

786. SERRATULA *linearifolia*. *D. C. Ann. mus. 2. t. 9. n. 10. S. multiflora. Wild. Sp. 3. p. 1643. Marsch. Fl. taur. n. 1639.* — Frequens in graminosis insulæ Berezen, propè Borysthenem. Floret julio. ♃

787. S. *xeranthemoïdes. Marsch. Fl. taur. n.* 1638. *Centaurea radiata. Wild. Sp.* 3. *p.* 2325. *Xeranthemum eruci-folium. Sp. pl.* 1201. — In pascuis Tauriæ ubique occurrit. Floret junio. ☿

788. STHÆHELINA *chamæpeuce. Sibth. n.* 2017. *Serratula chamæpeuce. Sp. pl.* 1147.

Jacea Cretica frutescens, elychrisi folio, flore magno purpurascente. *Tourn. Cor.* 32. *Icon. Aubriet.*

Erumpit è rupibus elatis insularum Coi, Leri, Sami, etc. Junio floret. ♄

789. CHRYSOCOMA *villosa. Sp. pl.* 1178. *Wild. Sp.* 3. *p.* 1792. *Marsch. Fl. taur. n.* 1686.

Conyza Armena pumila incana, oleæ folio. *Herb. Tourn.* — In herbidis Tauriæ ubique occurrit. Floret augusto. ☿

II. POLYGAMIA SUPERFLUA.

790. TANACETUM *vulgare. Sp. pl.* 1184. *Marsch. Fl. taur. n.* 1687.—Frequens circà Odessam. ☿

791. ARTEMISIA *absinthium. Sp. pl.* 1188. *Marsch. Fl. taur. n.* 1699.—Ad littora Bulgariæ, in scopulo Sto-Joanne propè Sisopoli. ☿

792. A. *arborescens. Sp. pl.* 1188. *Sibth. n.* 2030. — Ad latera vulcani novæ Camini copiosè; propè Theram. Florens maio. ☿

793. XERANTHEMUM *annuum. Sp. pl.* 1201. *Marsch. Fl. taur. n.* 1711.—In collibus apricis copiosissimè, circà Sevastopolem et Odessam. Julio floret. ⊙

794. X. *inapertum. Wild. Sp.* 3. *p.* 1902. *Marsch. Fl. taur. n.* 1712.— In arvis, circà Trapezum. ⊙

795. GNAPHALIUM *stœchas. Sp. Pl.* 1195. *Sibth.*

n. 2035. — In collibus insularum Archipelagi frequens. ♃

796. G. *Orientale. Sp. pl.* 1195. *Sibth. n.* 2036. Elychrysum Orientale. C. B. *Herb. Tourn.*

E. Orientale, foliis amplioribus subrotundis. *Cor.* 37. *Icon. Aubriet.*—In summis montibus insulæ Coi passim occurit. Florens maio. ♃

797. G. *arenarium. Sp. pl.* 1195. *Marsch. Fl. taur. n.* 1702.—Communis in apricis, propè Sevastopolem et Odessam. Junio floret. ♃

798. FILAGO *Germanica. Sp. pl.* 1311. *Gnaphalium Germanicum. Sibth. n.* 2044. *Marsch. Fl. taur. n.* 1708. —In cultis circà Trapezum. Junio florens. ☉

799. F. *Gallica. Sp. pl.* 1312. *Gnaphalium Gallicum. Sibth. n.* 2043. — In apricis insulæ Meli haud rarè. ☉

800. MICROPUS *erectus. Sp. pl.* 1313. *Sibth. n.* 2171.

Gnaphalium minus repens. C. B. *Herb. Tourn.*—Ad margines viarum, in insulâ Melitâ. ☉

801. M. *pygmæus. Desf. atl.* 2. *p.* 307. *Filago pygmæa. Sp. pl.* 1311. *Sibth. n.* 2169. Inter segetes insulæ Meli, propè Monasterium. Aprili floret. ☉

802. M. *exiguus. Filago exigua.*? *Sibth. n.* 2170.

M. caule exiguo dichotomo, floribus axillaribus terminalibusque involucratis, foliis ovato lanceolatis obtusis supernè glabriusculis subtùs tomentosis, calycibus exterioribus villosis, interioribus glabris nitidis.

Caulis vix bipollicaris.—In summo vulcano novæ Camini, propè Theram. Maïo. ☉

803. CONYZA *limonifolia. Sibth. n.* 2051. *C. candida. Wild. Sp.* 3. *p.* 1923.

C. Cretica fruticosa, folio molli candidissimo et tomentoso. *Tourn. Cor.* 33. *Herb. Tourn.* — In rupibus insularum Coi, Leri et Sami. Junio floret. ♄

804. SENECIO *lividus. Sp. pl.* 1216. *Sibth. n.* 2061. —In summo vulcano insulæ novæ Camini propè Theram. Maio floret. ☉

805. S. *squalidus. Sp. pl.* 1218. *D. C. Fl. fr. n.* 3172. — In incultis insulæ Meli frequens. Floret aprili. ♃

806. S. *vernus. Bivona Bernardi. Sic. pl. c.* 1. *p.* 73. S. *leucanthemi-folius. Poiret. Itin.* 2. *p.* 238.

A præcedenti differt staturâ altiore, pube magis copiosâ et foliorum lobis brevioribus et latioribus. — In pascuis Tauriæ. Maio floret. ☉

807. S. *aquaticus. Wild. Sp.* 3. *p.* 1997. *Sibth. n.* 2065. —In nemorosis Bulgariæ, ad pagum Ineada. ♃

808. S. *erucifolius. Sp. pl.* 1218. *Marsch. Fl. taur. n.* 1723. — Copiosè occurit in collibus apricis circà Sevastopolem. Floret junio. ♃

809. S. *tenui-folius. Persoon. Syn.* 2. *p.* 435? ♄ — In maritimis Tauriæ copiosissimè, circà urbem Kerch. Floret maio. ♃

810. ASTER *amellus. Sp. pl.* 1226. *Marsch. Fl. taur. n.* 1731.—In herbidis haud rarè, propè Odessam. ♃

811. INULA *ensi-folia. Sp. pl.* 1240. *Marsch. Fl. taur.* n. 1753.

In plantâ nostrâ caules sœpiùs 4-5 flores gestant, ca-

lycesque ferè glabri sunt.—In lazaret Odessæ, julio floret. ♆

812. I. *odora. Sp. pl.* 1236. *Sibth. n.* 2073.

Aster luteus, radice odorâ. C. B. *Herb. Tourn.*

Occurrit in collibus siccis, circà Sevastopolem. Junio floret. ♆

813. I. *Britannica. Sp. pl.* 1237. *Marsch. Fl. taur. n.* 1745.—Passim in nemorosis Bulgariæ, ad pagum Sisopoli. Floret julio. ♃

814 I. *Germanica. Wild. Sp.* 3. *p.* 2100. *I. media. Marsch. Fl. taur. Sup. n.* 576.

Flores corymbosi conferti. Pedicelli floribus æquales aut breviores.

Haud rara in nemorosis Bulgariæ, ad pagum Ineada, floret julio. ♃

815. I. *Orientalis. Wild. Sp.* 3. *p.* 1201. *I. Germanica. Marsch. Fl. taur. n.* 1752. *I. micranthos. Poiret. Ency. Sup. n.* 37.

Aster Armenius, salicis folio, flore luteo, minimo, umbellato. *Tour. Cor.* 36. *Gundelsheimer in Herb. Tourn.*

Differt à præcedente foliis minùs rigidis, squamis apice reflexis, floribus duplò minoribus.—Reperitur in collibus Bulgariæ, circà Sisopoli. Floret julio. ♃

816. I. *pulicaria. Sp. pl.* 1238. *Sibth. n.* 2077. — Ad rivos, in insulâ Thaso, augusto floret. ☉

817. DORONICUM *Orientale. Wild. Sp.* 3. *p. D. Caucasicum. Marsch. Fl. taur. n.* 1755.—Valdè frequens in collibus nemorosis circà Byzantium, ad pagum Therapia, maio ineunte floret. ♆

818. TUSSILAGO *farfara. Sp. pl.* 1215. *Sibth.*

n. 2058. — Circà Byzantium in umbrosis haud infrequens maio floret. ♃

819. BELLIS *annua. Sp. pl.* 1249. *Sibth. n.* 2087. —In graminosis circà Melitam omninò frequens, floret maio. ⊙

820. BELLIUM *bellidioïdes. Lin. Mant.* 285. *Sibth. n.* 2088.—In fissuris rupium insulæ Ferasiæ, propè Theram, maio floret. ⊙

821. CHRYSANTHEMUM *coronarium. Sp. pl.* 1254. *Sibth. n.* 2092.

Var. concolor radio discoque luteis sola reperitur inter segetes insulæ Melitæ.

Var. discolor radio albo discoque luteo copiosè occurrit in insulis Archipelagi. — Utraque floret aprili, maio. ⊙

822. PYRETHRUM *Caucasicum. Wild. Sp.* 3 *pl.* 2156. *Marsch. Fl. taur. Sup. n.* 1757.

Chamæmelum Cappadocicum, foliis pinnatis. *Gundelsheimer in Herb. Tourn.*

Affine *P. alpino.* Sed distinguitur foliis magis compositis etiam caulinis, pinnulis longioribus et tenuioribus, calycis squamis carinâ nigricantibus.—In collibus elatis, propè Trapezum, floret junio. ♃

823, P. *partheni-folium. Wild. Sp.* 3. *p.* 2156. *Marsch. Fl. taur. n.* 1764

A *P. parthenio* dignoscitur, pedunculis paucioribus longioribus et florum radio duplò longiore. — Ad muros et sepes copiosissimè, circà Trapezum, junio floret. ♃

824. A. *mille-foliatum. Wild. Sp.* 3. *p.* 2160. *Marsch. Fl. taur. n.* 1765.

Facie et habitu simile *Achilleæ aureæ*, sed facilè discernitur paleis nullis et seminibus pappo scarioso marginatis. — Abundat in graminosis circà Odessam; julio floret, ϰ

825. MATRICARIA *chamomilla*. *Sp. pl.* 1236. *Marsch. Fl. taur. n.* 1767.—In lazaret Odessæ minimè rara, julio. ⊙

826. ANACYCLUS *Creticus*. *Sp. pl.* 1258. *Sibth. n.* 2099. *Desf. an. Mus. v.* 11. *tab.* 22.

Cotula Cretica, maritima, minima, chamæmeli folio, capitulo inflexo. *Herb. Tourn.*

Copiosissimè occurrit in maritimis insularum Meli, Cimoli, Theræ, etc. Varietatem omninò flosculosam et tomentosam inveni in arenis Astypalææ; floret maio. ⊙

827. ANTHEMIS *cotula*. *Sp. pl.* 1261. *Marsch. Fl. taur. n.* 1773.—Ad sepes Colchidis, junio florens. ⊙

828. A. *tomentosa*. *Sp. pl.* 1260. *Sibth. n.* 2103. —In arenis maritimis insulæ Sami, julio floret.

829. A. *Chia*. *Sp. pl.* 1260. *Sibth. n.* 2105.

Chamæmelum vernum, folio crassiore, magno flore ex insulâ Chio. *Herb. Tourn. Icon. Aubriet.*

Abundat in arvis Asiæ minoris, propè Byzantium; maio. ☉

830. A. *tinctoria*. *Sp. pl.* 1263. *Marsch. Fl. taur. n.* 1775. — Frequens in collibus circà Sevastopolem, necnon in apricis, propè Sisopolim. Floret julio, ϰ

831. A. *montana*. *Sp. pl.* 1261. *Sibth. n.* 2109. *D. C. Fl. fr. n.* 3263. — In cacumine montium in-

tulæ Coi, ad altitudinem 4oo hexapodum, maio floret. ☿

832. A. *altissima*. *Sp. pl.* 1259. *Sibth.* n. 2101. —Ad margines viarum insulæ Coi, in arvis Tenedi haud rara. Florens julio. ☺

833. A. *Pontica*. *Wild. Sp.* 3. *p.* 2184. *Sibth.* n. 2110.—Communis in lazaret Odessæ, floret julio. ☿

834. A. *Ruthenica*. *Marsch. Fl. taur.* n. 1772. *A. maritima*. *Pallas. Ind. taur.*

A. foliis villosis incanis, pinnulis lanceolatis acutis, ramis floriferis corymbosis, receptaculo conico, paleis lanceolatis mucronatis, seminibus teretiusculis nudis, calyce pubescente, squamis obtusis margine scariosis.

Flores albi, paulò minores quàm in *A. altissimâ*.

In collibus graminosis copiosè circà Theodosiam maio floret. ☉

835. A. *Austriaca*. *Wild. Sp.* 3. *p.* 2181. *Sibth.* n. 2108. — Abundat in collibus Colchidis ad arcem Soukoum Kale, etiàm propè Trapezum, florens junio.

836. A. *maritima*. *Sp. pl.* 1259. *Sibth.* n. 2102. —Ad littora maris vulgaris, in insulâ Melitâ, florens aprili. ☉

837. A. *arvensis*. *Sp. pl.* 1261. *Sibth.* n. 2106. —In arvis maritimis insularum Melitæ Meliquæ ubique occurrit. ☉

838. ACHILLEA *compacta*. *Lam. Ency.* 1. *p.* 27. A. *distans*. *Wild. Sp.* 3. *p.* 2207.—Copiosissimè crescit in ruderatis, circà Theodosiam in Tauriâ. Florens julio. ☿

839. A. *nobilis. Sp. pl.* 1268. *Marsch. Fl. taur. n.* 1790.—Abundat in apricis Tauriæ, circà Sevastopolem, atque propè Odessam. Julio floret. ♃

III. POLYGAMIA FRUSTRANEA.

* *Squamis calycinis lanceolato-acuminatis.*

840. CENTAUREA *crupina. Sp. pl.* 1285. *Sibth. n.* 2132. *Marsch. Fl. taur. n.* 1794.

Var. a. Pinnis integris vix ciliatis occurrit in graminosis Tauriæ, ad oppidum Kerch.

Var. b. Pinnis serratis ferè pinnatifidis vulgaris est in apricis insulæ Meli, propè tumulos. — Utraque maio floret. ☉

841. C. *arenaria. Wild. Sp.* 3. *p.* 2278. *Marsch. Fl. taur. n.* 1806.

Squamæ calycis simplices subacutæ.—Valdè frequens in collibus aridis insulæ Tenedi. Floret junio. ♃

** *Squamis ciliatis.*

842. C. *cyanus. Sp. pl.* 1289. *Sibth. n.* 2137. — In summis montibus insulæ Coi, ad altitudinem 400 hexapodum. Maio floret. ☉

843. C. *spinosa. Sp. pl.* 1290. *Sibth. n.* 2140.

Jacea Cretica, aculeata, incana. *Tourn. Inst.* 445. *Herb. Tourn.*

Copiosissima in collibus incultis insularum Meli, Sami, Leri, Tenedi, Lesbi, etc. Æstate floret. ♄

844. C. *cineraria. Wild. Sp.* 3. *p.* 2294. C. *candidissima. Lam. Ency.* 1. *p.* 669.

Flores purpurei, duplò minores quàm in *C. scabiosâ.* —In rupibus maritimis Bulgariæ, ad pagum Ineada. Floret junio. ♃

845. C. *cinerea. Lam. Ency.* 1. *p.* 669. *Wild. Sp.* 3. *p.* 2294.

Variat foliis modò tomentosis modò ferè glabris.—In arenis maritimis et ad margines canalis Xerxis in peninsulâ montis Athonis. Floret junio. ♃

846. C. *ovina. Wild. Sp.* 3. *p.* 2292. *Marsch. Fl. taur. n.* 1826.—In collibus Tauriæ frequens, circà Sevastopolem. Florens junio. ♂

847. C. *Orientalis. Sp. pl.* 1291. *Marsch. Fl. taur. n.* 1814.—Vulgata in lazaret Odessæ. Floret julio. ♃

848. C. *scabiosa. Sp. pl.* 1291. *Marsch. Fl. taur. n.* 1810.—In graminosis circà Odessam copiosa. Floret julio. ♃

*** *Squamis ciliatis apice spinosis.*

849. C. *diffusa. Lam. Ency.* 1. *p.* 675. C. *parviflora. Marsch. Fl. taur. n.* 1825. *Sibth. n.* 2157.—Abundat in arvis propè canalem Xerxis, necnon in lazaret Odessæ. Julio floret. ♂

850. C. *eryngioïdes. Wild. Sp.* 3. *p.* 2321. *Lam. Ency.* 1. *p.* 675. *Sibth. n.* 2158.

Carduus eryngioïdes, capite spinoso. *Tourn.*—Frequens in collibus aridis insulæ Meli; propè monasterium. Maio floret. ♃

851. C. *raphanina. Sibth. n.* 2164.

C. caulescens, foliis longis subtomentosis pinnatis, pinnis ovatis coriaceis remotis utrinque valdè attenuatis,

flore maximo terminali solitario, squamis calycinis glabris ciliatis spinâ crassâ longissimâ terminatis.

Jacea Cretica, acaulos, cichoriifolio. *Tourn. Cor.* 32. *Icon. Aubriet.*

Caulis vix semi-pedalis interdùm subnullus, basi ramosus. Pinni foliorum subpetiolati, quandoque pinnuli minores interjecti; spinæ calycis flavescentes. Flos purpureus duplò vel triplò major quàm in C. *scabiosâ*. — In collibus elatis insulæ Sami, rariùs. Junio floret. ♃

**** *Calycinis spinis compositis.*

852. C. *Adami. Wild. Sp.* 3. *p.* 2310. *Marsch. Fl. taur. n.* 2310. C. *solsticialis. Pallas. Ind. taur.*

Squamæ potiùs ciliatæ quàm spinosæ, apice vix aculeatæ.—Communis in herbidis, propè Odessam. Floret julio. ☉

853. C. *Sicula. Sp. pl.* 1298. *Sibth. n.* 2153.—In cultis insulæ Melitæ haud rara. Aprili florens. ☉

854. C. *exscapa.* C. *acicularis ? Sibth. n.* 2155.

C. acaulis, foliis radicalibus humifusis tomentosis pinnatis, pinnis subincanis decurrentibus, floribus 4-8 confertis sessilibus è radice prolatis, calycibus glabris basi tomentosis, squamis ciliatis, spinâ elongatâ ramosâ terminatis.

Jacea Armena, incana, acaulos et multiflora, foliis laciniatis. *Gundelsheimer in Herb. Tourn. Icon Aubriet.*

Flores lutei, paulò majores quàm in præcedente. Frequentissimè reperitur in montibus insulæ Coi. In petrosis Leri. Florens maio, junio. ♃?

***** *Calycinis spinis simplicibus.*

855. C. *pumila. Sp. pl.* 1300. *Sibth. n.* 2166.

In plantâ nostrâ flores purpurei, caulis subnullus, folia ferè glabra, squamæ calycis glaberrimæ, apice subciliatæ spinâ gracili patente elongatâ terminatæ.—Ad sepes insulæ Meli copiosissimè occurrit. Maio florens. ☼

856. GALACTITES *tomentosa. D. C. Fl. fr. n.* 3071. *Centaurea galactites. Sp. pl.* 1300. *Sibth. n.* 2167.— In incultis insulæ Melitæ valdè communis. Aprili floret. ☼

IV. POLYGAMIA SEGREGATA.

857. ECHINOPS *spinosus. Lin. Mant.* 119. *Desf. Atl.* 2. *p.* 310. *Sibth. n.* 2173.

E. Creticus, capite magno, aculeato. *Tourn. Cor.* 34. *Icon. Aubriet.*

In incultis insularum Coi, Sami, Tenedi, etc. Junio floret. ☼

858. E. *lanuginosus. Lam. Ency.* 2. *p.* 336. *Wild. Sp.* 3. *p.* 2398. *Sibth. n.* 2175.

Echinops parvus, tenuissimè divisus et lanuginosus, capite minori ex insulis M. Ægei. *Herb. Tourn. Icon. Aubriet.*

Copiosè occurrit in arvis maritimis insulæ Meli. Maio floret. ☼

859. E. *microcephalus. Sibth. n.* 2174.

E. caule ramoso lanuginoso, foliis pinnatifidis utrinque sublanatis planis, ramis foliosis, capitulis minoribus subsessillibus.

Ab E. *ritro* distinguitur foliis utrinque obscurè viren-

tibus minimè canis, caulibus ramosis, floribus minoribus et ferè sessilibus.—In arvis Sami, ad canalem Xerxis, in umbrosis Bulgariæ. Junio, julio florens. ♃

XIX. GYNANDRIA.

1. MONANDRIA.

860. ORCHIS *bifolia. Sp. pl.* 1351. *Marsch. Fl. taur. n.* 1832. — In sylvis Colchidis minimè rara. Junio florens. ♃

861. O. *saccata.* Labello obcordato trilobo, laciniâ media minore, petalis patentibus, spicâ laxâ, cornu germine pauló breviore basi inflatâ, bracteis flore sublongioribus.

Proxima O. *laxiflora*; sed dignoscitur foliis latioribus, bracteis longioribus, præsertim calcari basi saccato nunquàm apice emarginato. — Cum præcedente in umbrosis Colchidis. Junio florens. ♃

862. O *pyramidalis. Sp pl.* 1332. *Sibth. n.* 2177. —In collibus apricis insulæ Melitæ haud infrequens; floret aprili. ♃

863. O. *condensata. Desf. atl.* 2. *p.* 316. *Persoon. Syn.* 2. *p.* 505. — In aridis insulæ Melitæ. Aprili floret. ♃

864. O. *coriophora. Sp. pl.* 1332. *Sibth. n.* 2178. —In apricis insulæ Meli copiosa aprili florens. ♃

865. O. *cassidea. Marsch. Fl. taur. Sup.* 1855.

O. *coriophora. b. inodora. D. C. Fl. fr. Sup. n.* 2008.

O. labello tripartito; laciniis inæqualibus dependenti-

bus, petalis in cucullo connatis, denticulis tantùm apicis liberis longè accuminatis, cornu conico recurvo germine paulùm breviore.

Præcedenti affinis; attamen differt floribus majoribus laxioribus amœnè variegatis, cucullo lanceolato longè acuminato, bracteis acutis scariosis albidis; præsertim odore nullo. Ad sequentem accedit habitu formâque spicæ et cuculli, sed statim distinguitur floribus duplò minoribus, et labelli lobis integris. — In ericetis scopuli St-Istad, propè Cimolum. Maio florens. ♃

866. O. *sancta. Sp. pl.* 1330.

O. bulbis indivisis, caule folioso, labello di atato trilobo, laciniâ mediâ integrâ lineari subulatâ multò longiore, lateralibus striatis dentatis ferè laciniatis, petalis connatis in cucullo incurvo apice tantùm triaristato. Calcare recurvo germine breviore.

Species formossima. Caulis sesquipedalis bipedalisve foliosus, folia radicalia oblongo-lanceolata basi attenuata, superna subimbricata latè vaginata in discum brevem acutum abeuntia, flores elegantissimi magni albo purpureoque variegati in spicam 4-6 uncialem dispositi; bracteæ scariosæ acuminatæ germini subæquales. Floris labellum cum cucullo anticè recurvo longèque acuminato rostrum avis sæpè ludunt.

Ad sepes insulæ Coi communis. Maio florentem legi. ♃

867. O. *mascula. Sp. pl.* 1333. *Sibth. n.* 2180. —Circà Byzantium, in nemorosis. Maio floret. ♃

868. O. *morio. Sp. pl.* 1333. *Sibth. n.* 2179. *Marsch. Fl. taur. n.* 1837. — In collibus Meli, in pascuis Tauriæ propè Kerch atque Theodosiam frequens. Floret maio. ♃

869. O. *provincialis. D. C. Fl. fr. Sup. n.* 2008 (*a*). *Loïsel. Fl gall.* 2. *p.* 603. O. *pallens. Savi. Fl. Pis.* 2. *p.* 300.

Orchidis species ex nemorosis Carthusiæ Laverno. *Herb. Tourn.*

In nemoribus circà Byzantium frequens. Floret maio. ♃

870. O. *Brachystachys.* Foliis linearibus acutis, labello trilobo, laciniâ mediâ integrâ lateralibus subæquali, petalis lanceolatis striatis acuminatis conniventibus, cornu gracili descendente germine longiore, bracteis lanceolatis longissimè aristatis : spicâ longissimâ.

Flores albidi parvi ; spica vix pollicem longa, bracteæ in longissimas aristas desinent floresque superant. — In apricis insulæ Meli. Aprili floret. ♆

871. O. *papilionacea. Sp. pl.* 1331. *Sibth. n.* 2185.

O. Orientalis et Lusitanica, flore maximo, papilionem referente. *Tourn. Cor.* 30. *Icon. Aubriet.*

Frequens in collibus Meli, floret aprili. ♃

872. LIMODORUM *abortivum. D. C. Fl. fr. n.* 2048. *Orchis abortiva. Sp. pl.* 1336.—In petrosis insulæ Meli, aprili florens. ♃

873 SERAPIAS *lancifera. St. Amans. Fl. agen. p.* 378.

Orchis Gallo-Græca, flore ferrugineo maximo. *Herb. Tourn.*

S. bracteis maximis lanceolatis flore longioribus ; labello tripartito ; laciniis lateralibus obtusis erectis, mediâ lanceolatâ acuminatâ, disco piloso dependente.

Quasi media inter *S. lingam* et *S. cordigeram* ; à

primâ differt labelli disco piloso, ab alterâ laciniâ mediâ lanceolatâ minimè cordatâ, ab utrâque caule altiore floribus et bracteis majoribus.

Valdè frequens in collibus insulæ Meli necnon in graminosis Colchidis, ad arcem Soukoum-Kale, floret maio, junio. ϰ

874. EPIPACTIS *ensi-folia. Wild, Sp. 4. p. 85. Sibth. n. 2203.*—Circà Byzantium copiosa, in nemorosis, maio floret. ϰ

II. HEXANDRIA.

875. ARISTOLOCHIA *clematitis. Sp. pl. 1364. Marsch. Fl. taur. n. 1860.* — Ad sepes in Colchide minimè rara, junio floret. ϰ

XX. MONOECIA.

I. TRIANDRIA.

876. CAREX *schœnoïdes. Wild. Sp. 4. p. 226. Marsch. Fl. taur n. 1872. D. C. Fl. fr. n. 1704.* — In arenosis maritimis Tauriæ, propè Sevastopolem. ϰ

877. C. *nutans. Wild. Sp. 4. p. 299. Marsch. Fl. taur. n. 1892.*—Abundat in pascuis Tauriæ, ad Bosphorum Cimmerianum, maio florens. ϰ

878. C. *intermedia. Goodenough. tr. Lin. 2. p. 154. C. spicata. Lam. Ency. 3. p. 381. C. disticha. D. C. Fl. fr. n. 1703.*—In herbidis Tauriæ propè Kerch, etiam in arenosis Colchidis ad arcem Soukoum-Kale, maio floret. ϰ

879. C. *remota. Wild. Sp. pl. 1383. Marsch. Fl.*

taur. n. 1877. *Sibth. n.* 2220. — Frequens occurrit in umbrosis Colchidis et Bulgariæ, junio florens. ♃

880. C. *vulpina. Sp. pl.* 1382. *Marsch. Fl. taur. n.* 1874.—In pratis Colchidis haud rara, maio florens. ♃

II. TETRANDRIA.

881. URTICA *dioïca. Sp. pl.* 1396. *Sibth. n.* 2245. *Marsch. Fl. taur. n.* 1902.—Propè Byzantium et Odessam; in ruderatis ubique reperitur. ♃

882. PARIETARIA *officinalis. Sp. pl.* 1492. *Sibth. n.* 371.—Circà Byzantium, in ruderatis abundat. ♃

883. P. *Cretica. Sp. pl.* 1492. *n.* 373.

P. minor, Cretica, capsulis seminum alatis. *Herb. Tourn.*

In rupibus insularum Meli, Cimoli, Camini novæ propè Theram, aprili floret. ♃

III. POLYANDRIA.

884. POTERIUM *sanguisorba. Sp. pl.* 1411. *Marsch. Fl. taur. n.* 1911. — Copiosum in herbidis Tauriæ propè Kerch atque ad sepes Colchidis, maio floret. ♃

885. P. *spinosum. Sp. pl.* 1412. *Sibth. n.* 2258.

Pimpinella spinosa seu sempervirens. *Herb. Tourn.* —In collibus siccis insularum Archipelagi ubique crescit. Floret maio. ♄

886. QUERCUS *ægilops. Sp. pl.* 1414. *Sibth. n.* 2264.

Q. Orientalis, castaneæ folio, glande reconditâ in

cupulâ crassâ et squamosâ. *Tourn. Cor.* 46. *Herb. Tourn.*

In insulâ Lero, in littore Attico, in campis Trojanis hæc pulchra species copiosè reperitur.

887. Q. *pseudo-coccifera. Desf. atl.* 2. *p.* 549. *Persoon. syn.* 2. *p.* 568.

Arbos fastigiata 20-25. pedalis. In montibus insulæ Scyri. ♄

888. Q. *pubescens. Wild. Sp.* 4. *p.* 450. *Marsch. Fl. taur. n.* 1915.—In nemoribus Bulgariæ. ♄

889. CARPINUS *betulus. Sp. pl.* 1416. *Marsch. Fl. taur. n.* 1919.—Arbos eximiæ magnitudinis in sylvis Colchidis. ♄

890. PLATANUS *Orientalis. Sp. pl.* 1417. *Sibth. n.* 2276. — Circà Byzantium vulgar ♄

891. ARUM *dracunculus. Sp. pl.* 1367. *Sibth. n.* 2277. — In montibus elatis insulæ Coi copiosè. Maio floret. ♃

IV. MONADELPHIA.

892. CROTON *tinctorium. Sp. pl.* 1425. *Sibth. n.* 2287. — Abundat in arvis Argolidis. Augusto florens. ☉

893. BRYONIA *dioïca. Wild. Sp.* 4. *p.* 621. *Sibth. n.* 2252. — Ad sepes in insulâ Astypalæâ. Maio floret. ♃

894. B. *Cretica. Sp. pl.* 1439. *Sibth. n.* 2253. *Desf. Cor. p.* 91. *t.* 70.

B. cretica, maculata. C. B. *Herb. Tourn.* — Frequens in ruderatis insulæ Meli. Florens aprili. ♃

XXI. DIOECIA.

I. DIANDRIA.

895. HIPPOPHAE *rhamnoïdes*. *Sp. pl.* 1452. *Marsch. Fl. taur. n.* 1943.—In sylvis Colchidis copiosissimè crescit. ♄

II. TRIANDRIA.

896. FICUS *carica*. *Sp. pl.* 1513. *Sibth. n.* 2335. —In Archipelagi saxosis ubique. ♄

III. PENTANDRIA.

897. PISTACIA *terebinthus*. *Sp. pl.* 1455. *Sibth. n.* 2307.—In nemoribus Archipelagi frequens. Colitur in arvis insulæ Coi; tùm fit arbos ramosa fastigiata 30-40 pedalis. ♄

898. P. *lentiscus*. *Sp. pl.* 1455. *Sibth. n.* 2308.—Vulgaris in insulis Archipelagi. ♄

IV. OCTANDRIA.

899. POPULUS *alba*. *Sp. pl.* 1463. *Sibth. n.* 2315. —Ad littora maris in sinu Pelasgo. ♄

900. P. *tremula*. *Sp. pl.* 1464. *Sibth.* 2316.—Circà Byzantium haud rara. ♄

V. MONADELPHIA.

901. JUNIPERUS *oxycedrus*. *Sp. pl.* 1470. *Sibth. n.* 2322.—In insulis Melo, Coo, Samo etc. Ubique reperitur. ♄

902. EPHEDRA *monostachya*. *Sp. pl.* 1472. *Marsch.*

Fl. taur. n. 1962. — In herbidis Tauriæ coplosè, ad oppidum Kerch. Florens maio. ♄

903. E. *distachya. Sp. pl.* 1472. *Sibth. n.* 2328. —In insulâ Melo, in rupibus novæ Camini, propè Theram. Maio florens. ♄

XXII. CRYPTOGAMIA.

FILICES.

904. CHEILANTHES *suaveolens. Swartz. Fil.* 127. *Sibth. n.* 2367. *Polypodium fragrans. Desf. atl.* 2. *p.* 408. *t.* 257. *Adianthum odorum. D. C. Fl. fr. Sup. n.* 1401.—In rupibus insulæ Astypalææ. ♃

905. PTERIS *aquilina. Sp. pl.* 1535. *Sibth. n.* 2364. In summo vulcano novæ Camini, propè Theram. ♃

906. ASPIDIUM *aculeatum. Wild. Sp.* 5. *p.* 258. *Sibth. n.* 2352. *Polypodium aculeatum. Sp. pl.* 1552. —In sylvis Colchidis ad arcem Soukoum-Kaleh, necnon propè Trapezum. ♃

907. ACROSTICHUM *leptophyllum. D. C. Fl. fr. n.* 1432. *Polypodium? leptophyllum. Sp. pl.* 1553. *Sibth. n.* 2348. *Grammitis leptophylla. Swartz. fil.* 23. 218.

Adianthum minimum, folio vario. *Herb. Tourn.*

Ad torrentes insulæ Meli, in novâ Camini propè Theram sub rupibus vulcaniis ferè nudis. ♃

ALGÆ.

Nota. L'article suivant sur les Thalassiophytes appartient entièrement à M. Lamouroux professeur d'histoire

naturelle à Caen, corespondant de l'Institut, de la Société Linnéenne de Paris, etc., et que je m'honore de compter au nombre de mes amis. A mon retour de la mer Noire je partageai avec lui toutes les plantes marines que j'avais rapportées de mon second voyage et ce savant naturaliste a bien voulu me communiquer son travail. Je suis trop heureux de pouvoir ajouter à mon faible essai cet interressant morceau.

« FUCUS *natans. var. spinosa.* Ramis spinosis; foliis brevibus undulatis; fructificationibus ramosis brevissimis. Constantinople.

« (*n*) Cette variété très-commune dans le canal de Constantinople doit constituer une espèce. Presque tous les botanistes l'ont confondue avec le *fucus natans.*

« F. *linifolius. Turn.* Melos.

« F. *fimbriatus. Desf.* Melos.

« F. *abies. Bertol.* Melos, Caffa, Soukoum, Nicomédie, Trébisonde, Sévastopole.

« F. *selaginoïdes. Turn.* Melos.

« F. *ericoïdes. Gmel.* Melos.

« F. *volubilis. Linn.* Nicomédie.

« (*n*) Il paraît que les fucacées sont très-rares dans la mer Noire. Le *fucus abies* est le seul que M. d'Urville y ait trouvé. Le groupe si nombreux des *fucus* vésiculeux, les grandes laminaires, les élégantes Desmarestias ne paraissent pas y exister.

« DELESSERIA *nervosa. Lamx.* Caffa, Melos, Soukoum, Nicomédie, Sévastopole.

« D. *ocellata. Lamx.* Melos.

« GELIDIUM *corneum. var. arbuscula. Lamx.* Melos.

« G. *corneum. var. hypnoïdes. Lamx.* Soukoum, Sévastopole.

« G. *corneum. var. setacea. Lamx.* ramis longis setaceis. *var. nova.* Trébizonde.

« LAURENCIA *gelatiniosa. Lamx.* Sévastopole.

« *L. pistillaris. Sp. nov.* ramis sparsis; ramulis pistilliformibus ad apicem ramorum. Caffa.

« (*n*) Cette laurencie diffère de l'*obtusa* par sa grandeur beaucoup plus considérable, par le petit nombre de ses rameaux, enfin par la forme des ramuscules semblables à des pistils ou de petites massues très développées aux extrémités.

« HYPNEA *spinulosa. Lamx.* Melos, Nicomédie.

« GIGARTINA *marginalis. Lamx.* Soukoum.

« G. *tristis. Sp. nov.* Pumila, atropurpurea, cespitosa vel dumetosa, ramosissima; ramis rigidis, numerosis, brevibus, apicibus sæpè bifurcatis, tuberculis sparsis. Trébizonde.

« Cette gigartine diffère de l'*acicularis* par sa petitesse, par la roideur de toutes ses parties, par sa couleur d'un pourpre presque noir, enfin par ses rameaux plus nombreux et plus courts.

« G. *Urvillii. Sp. nov.* cespitosa, ramosa, elegantissimè colorata; ramis teretibus sparsis; ramulis fusiformibus ad apicem ramorum numerosissimis, tuberculis sparsis. Constantinople, sur les rochers et sur les coquilles.

« (*n*) J'ai dédié cette plante à M. D'URVILLE en témoignage de ma sincère amitié ; c'est la plus jolie de toutes les hydrophytes qu'il a rapportées de son voyage. Elle offre les plus brillantes nuances de rouge, de jaune et de vert. Quoique haute à peine de deux pouces, elle a un port très-élégant voisin de celui des *Gig. capillaris* et *clavellosa*.

« G. *confervoides*, *et var.* *Lamx.* Melos.

« G. *uvaria*. *Lamx.* Melos.

« (*n*) Il est à remarquer que parmi les floridées rapportées par notre voyageur, il ne s'y trouve aucune plocamie, aucun chondrus et une seule délesserie, genres si communs dans l'Océan Européen. Cette délesserie habite dans toute l'étendue de la Méditerranée et de la mer Noire.

« DICTYOPTERIS *polipodioides*. *Lax.* Melos.

« PADINA *pavonia*. *Lamx.* Melos, Nicomédie.

« P. *squamata*. *Lamx.* Nicomédie, Soukoum.

« FLABELLARIA *Desfontainii*. *Lamx.* Melos.

« (*m*) Les dictyotées assez communes dans la Méditerranée paraissent rares dans la mer Noire; M. D'URVILLE n'a trouvé que des fragmens du *padina squamata* et pas un seul *dyctiota* genre répandu dans toutes les mers tempérées. J'attribue ce fait au peu de salure des eaux de la mer Noire.

« ULVA *lactuca*. *Linn.* Melos, Nicomédie, Constantinople, Caffa, Soukoum, Trébizonde.

« U. *umbilicalis*. *Linn.* Melos, Constantinople.

« U. *crispa*. *Linn.* Melos, Trébizonde, Constantinople.

« U. *caulescens. Lamx.* Caffa.

« U. *linza. Linn.* Nicomédie.

« U. *compressa. Lin.* Nicomédie, Trébizonde.

« U. *compressa. var.* Id. Id.

« BRYOPSIS *setacea. Sp. nov.* Ramulis sparsis numerosissimis, setaceis, separatim vix conspicuis. Constantinople.

« CAULERPA *prolifera. Lamx.* Melos, Soukoum, Lerne, dans la mer en face du marais; elle y est très-commune.

« (*n*) Les Ulvacées paraissent proportionnellement plus nombreuses dans la mer Noire que les autres hydrophytes.

« CERAMIUM *hirsutum. Fl. fr.* Sevastopole.

« C. *scoparium. Fl. fr.* Id.

« C. *rubrum. Roth.* Constantinople, Soukoum, Caffa, Trébizonde.

« C. *elegans. var.* Melos, Caffa.

« C. *atropurpureum. var. nov.* Tenuissima, elongata, ramis setaceis. Caffa.

« C. *aspergillosum. Sp. nov.* Vix conspicuum, roseum, ramosum; ramulis ad apicem ramorum fasciculatis. Constantinople.

« C. *rupestre. var. nov. tenuissima.* Constantinople.

« C. *linum et var.* Constantinople, Trébizonde.

« C. *rugosum. Sp. nov.* Viride, ramosum; ramis sparsis superficie rugosâ. Caffa.

« C. *sericeum.* Constantinople. Id. *Var. splendens, tenuissima.* Constantinople.

« D'après cette liste, l'on voit que M. D'Urville a rapporté de son voyage plus de 40 espèces ou variétés d'hydrophytes parmi lesquelles il y en a un quart environ de nouvelles. Si l'on considère le peu de temps qu'il a pu donner à la recherche des plantes marines, cette quantité paraîtra plus grande. Telle qu'elle est, elle sert à démontrer, 1°. que les hydrophytes qui aiment les eaux saumâtres telles que les ulves y sont proportionnellement plus communes que les autres; 2°. que les fucacées y sont très-rares, ainsi que les delesseries et les dictyotées; 3°. que plusieurs genres nombreux en espèces, répandues dans presque toutes les mers, manquent dans la mer Noire

« De l'examen des hydrophytes, je crois pouvoir encore en tirer cette conséquence : il doit y avoir peu de polypiers flexibles et encore moins de polypiers madréporiques dans le Pont-Euxin. Leur nombre doit augmenter à mesure que l'on se rapproche de la Méditerranée. »

ERRATA.

Pag. 7.	lin. 10.	*loco* supernâ *lege* superno.
7.	27.	supernâ *leg.* superno.
7.	31.	solitares *leg.* solitariæ.
10.	21.	*Post lineam adde* In collibus Tauriæ. ♃
13.	25.	MONANDRIA, *leg.* MONOGYNIA.
22.	26.	vulgaris *leg.* vulgare.
25.	20.	vulgaris *leg.* vulgare.
27.	14.	volubilis *leg.* volubile.
48.	14.	solitaribus *leg.* solitariis.
87.	30.	duoque *leg.* duasque.
94.	10.	solitares *leg.* solitariæ.
94.	28.	solitaribus *leg.* solitariis.
102.	23.	solitaribus *leg.* solitariis.

INDEX GENERUM.

Acanthus. 76
Acer. 42
Achillea. 114
Acrostichum. 126
Adonis. 60
Ægylops. 11
Æsculus. 41
Agrostemma. 51
Agrostis. 6
Aira. 7
Ajuga. 63
Allium. 36
Alopecurus. 8
Althæa. 83
Alyssum. 79
Amaryllis. 36
Ammi. 31
Anacyclus. 113
Anagyris. 43
Anchusa. 19
Androsace. 23
Anethum. 33
Anthemis. 113
Anthericum. 39
Anthyllis. 86
Antirrhinum. 73
Arabis. 82
Arbutus. 44
Arenaria. 49
Aristolochia. 122
Artemisia. 108
Arum. 124
Asparagus. 39
Asperugo. 21
Asperula. 15
Asphodelus. 39
Aspidium. 126
Aster. 110
Astragalus. 91
Atractylis. 104
Atriplex. 28
Atropa. 26
Avena. 11
Azalea. 25
Ballota. 69
Bartsia. 73
Bellis. 112
Bellium. 112
Berberis. 40
Beta. 29
Biscutella. 80
Borrago. 21
Brassica. 82
Bromus. 10
Bryonia. 124
Bryopsis. 130
Bryza. 9
Bunias. 77
Bunium. 31
Buplevrum. 29
Cachrys. 31
Calamagrostis. 11
Camelina. 78
Campanula. 24
Capparis. 56
Carduus. 105
Carex. 122
Carlina. 104
Carpinus. 124
Carthamus. 103
Caucalis. 30
Caulerpa. 130
Centaurea. 115
Ceramium. 130
Cerastium. 52
Cercis. 43
Cerinthe. 20
Chærophyllum. 34
Cheilantes. 126
Cheiranthus. 81
Chelidonium. 56
Chironia. 27
Chondrilla. 100
Chrysanthemum. 112
Chrysocoma. Pag. 108
Cichorium. 103
Cicuta. 31
Circæa. 2
Cirsium. 106
Cistus. 56
Clinopodium. 70
Cochlearia. 77
Colchicum. 41
Colutea. 89
Convolvulus. 23
Conyza. 110
Cornus. 18
Coronilla. 89
Cotyledon. 50
Crambe. 77
Crassula. 36
Cratægus. 55
Crepis. 101
Cressa. 27
Crocus. 5
Croton. 124
Crucianella. 17
Cuminum. 32
Cuscuta. 28
Cyclamen. 23
Cynanchum. 27
Cynoglossum. 20
Cynosurus. 8
Cyperus. 6
Cytisus. 89
Dactylis. 9
Daphne. 42
Datura. 25
Daucus. 31
Delesseria. 127
Delphinium. 57
Dianthus. 45
Dictamnus. 43
Dictyopteris. 129
Digitalis. 76
Doronicum. 111

Dorycnium. Pag. 96

Echinaria. 6
Echinophora. 29
Echinops. 118
Echium. 22
Elymus. 12
Elæagnus. 18
Epimedium. 18
Epipactis. 122
Ephedra. 125
Erica. 42
Erodium. 83
Erucaria. 77
Ervum. 89
Eryngium. 29
Erysimum. 81
Euphorbia. 52
Euphrasia. 73

Fedia. 5
Ferula. 32
Festuca. 9
Fucus. 125
Filago. 109
Flabellaria. 129
Frankenia. 40
Fritillaria. 38
Fucus. 127

Galactites. 118
Galega. 91
Galium. 15
Gelidium. 128
Genista. 85
Geranium. 83
Geropogon. 98
Gigartina. 128
Glinus. 54
Glycyrrhiza. 89
Gnaphalium. 108
Gypsophyle. 45

Hedysarum. 90
Helianthemum. 57
Heliotropium. 18
Herniaria. 28
Hesperis. 82
Hibiscus. 84
Hieracium. 100
Hippocrepis. 90
Hippophae. 125

Holosteum. Pag. 13
Hordeum. 12
Hyacinthus. 39
Hyosciamus. 25
Hyoseris. 100
Hypecoüm. 18
Hypericum. 58
Hypnea. 128

Iberis. 77
Inula. 110
Iris. 5
Isatis. 80

Juncus. 39
Juniperus. 125

Knautia. 14
Kæhleria. 10

Lactuca. 99
Lagœcia. 26
Lagurus. 10
Lamarkia. 8
Lamium. 67
Lappa. 104
Lapsana. 103
Lathyrus. 87
Laurencia. 128
Laurus. 43
Lavatera. 83
Leontice. 40
Leontodon. 100
Leonurus. 69
Lepidium. 78
Ligustrum. 1
Limodorum. 121
Linaria. 74
Linum. 36
Lithospermum. 19
Lotus. 96
Lupinus. 86
Luzula. 40
Lychnis. 51
Lycopsis. 21
Lycopus. 3
Lysimachia. 23
Lythrum. 52

Marrubium. 69
Matricaria. 113
Medicago. 97

Melilothus. Pag. 93
Melica. 7
Melissa. 72
Melittis. 72
Mentha. 66
Mesembrianthemum. 55
Mespilus. 55
Micropus. 109
Myagrum. 77
Myosotis. 19

Narcissus. 36
Nardus. 6
Nepeta. 65
Nerium. 27
Nigella. 58

Œnanthe. 33
Olea. 1
Onobrychis. 90
Ononis. 85
Onopordon. 105
Onosma. 20
Orchis. 119
Origanum. 70
Ornithogalum. 38
Ornithopus. 90
Orobanche. 76
Orobus. 86

Padina. 129
Paliurus. 26
Pancratium. 36
Panicum. 8
Papaver. 56
Parietaria. 123
Paronychia. 26
Pastinaca. 33
Peganum. 52
Periploca. 27
Phalaris. 7
Pharnacium. 34
Phleum. 8
Phlomis. 70
Phyllirea. 1
Physalis. 26
Picris. 100
Pimpinella. 33
Pistacia. 125
Pisum. 87

Plantago. Pag. 17
Platanus. 124
Poa. 9
Polycarpon. 13
Polygala. 84
Polygonum. 43
Polypogon. 8
Populus. 125
Potentilla. 55
Poterium. 123
Prasium. 72
Prunella. 72
Pteris. 126
Pyrethrum. 112

Quercus. 123

Ranunculus. 60
Raphanus. 82
Reseda. 52
Rhamnus. 26
Rhododendrum. 44
Rhus. 34
Rosa. 55
Rottbolla. 11
Rubia. 17
Rubus. 55
Rumex. 41
Ruta. 44

Saccharum. 11
Sagina. 18
Salicornia. 1
Salsola. 29
Salvia. 3
Satureia. Pag. 65
Saxifraga. 44
Scabiosa. 13
Scandix. 33
Scilla. 39
Scirpus. 6
Schænus. 6
Scleranthus. 44
Scolymus. 103
Scorpiurus. 90
Scorzonera. 98
Scrophularia. 75
Scutellaria. 72
Secale. 12
Sedum. 51
Senecio. 110
Serapias. 121
Seriola. 103
Serratula. 107
Sesamum. 76
Seseli. 33
Sherardia. 15
Sideritis. 66
Silene. 47
Sinapis. 82
Sisymbrium. 80
Sium. 32
Smyrnium. 33
Sonchus. 99
Spartium. 84
Stachys. 67
Staphylea. 34
Sthæhelina. 108
Statice. 34
Stipa. 10
Symphytum. 20

Tamarix. Pag. 34
Tanacetum. 108
Teucrium. 63
Thalictrum. 60
Thapsia. 31
Thesium. 24
Thlaspi. 78
Thymbra. 65
Thymus. 71
Tordylium. 32
Tragopogon. 98
Trifolium. 93
Trigonella. 97
Triticum. 13
Tussilago. 111

Ulva. 129
Urospermum. 98
Urtica. 123

Vaccinium. 42
Valantia. 17
Valeriana. 4
Valerianella. 5
Velezia. 28
Verbascum. 25
Veronica. 2
Vicia. 87
Vinca. 26
Viola. 26
Vitex. 73

Xeranthemum. 108

Zygophyllum. 43